

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GULMA *Azolla pinnata* DAN LAMA PERENDAMAN AIR KELAPA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG TANAH

By Oktavianus Lumban Tobing

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GULMA *Azolla pinnata* DAN LAMA PERENDAMAN AIR KELAPA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG TANAH

The Effect of Azolla pinnata Weed Extract and Long Soaking of Coconut Water on Peanut Growth and Yield

Muhammad Rezky Dwiputra Pulungan^a, Oktavianus Lumban Tobing^b, Yanyan Mulyaningsih^b

^aProgram Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda

^bStaf Pengajar Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda

Jalan Tol Ciawi, No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi-Bogor, 16720

*Email korespondensi: oktavianus@unida.ac.id

Diterima 21 Oktober 2020/Disetujui 27 April 2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk memahami pengaruh pemberian ekstrak *Azolla pinnata* dan lama perendaman benih pada air kelapa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial. Dosis *Azolla pinnata* terdiri atas empat taraf: 0%, 1%, 1.5%, dan 2% masa media tanam (mmt). Lama perendaman benih dengan air kelapa terdiri atas empat taraf yaitu direndam selama 0 jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Dosis pemberian *Azolla pinnata* pada media tanam dan lama perendaman benih dalam air kelapa memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot segar dan kering tajuk, bobot segar akar, jumlah polong, persentase polong isi, dan jumlah bintil akar. *Azolla pinnata* dapat menjadi pupuk alternatif, dan air kelapa dapat berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh alami.

Kata kunci: gulma air, produksi kacang tanah, ZPT alami

ABSTRACT

The aim of the research was to understand the effect of giving *Azolla pinnata* extract and the duration of soaking the seeds in coconut water on the growth and yield of peanut plants. The experiment used a factorial completely randomized design (CRD). The dosage of *Azolla pinnata* consists of four levels: 0%, 1%, 1.5%, and 2% mass of growing media (mmt). The duration of soaking the seeds with coconut water consists of four levels, namely soaking for 0 hours, 6 hours, 12 hours, and 24 hours. The dose of giving *Azolla pinnata* on the planting media and the duration of soaking the seeds in coconut water had a positive effect on plant height growth, number of leaves, leaf area, shoot fresh and dry weight, root fresh weight, number of pods, percentage of filled pods, and number of root nodules. *Azolla pinnata* can be an alternative fertilizer, and coconut water can function as a natural growth regulator.

Keywords: natural PGRs, peanut production, water weed

PENDAHULUAN

Kacang tanah merupakan salah satu komoditas agribisnis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena selain dapat dikonsumsi langsung juga dapat dijadikan bahan baku olahan pabrik. Peningkatan produksi kacang tanah dapat dilakukan antara lain melalui pemberian ekstrak gulma *Azolla pinnata* dan air kelapa. Produk olahan dari kacang tanah antara lain selai, kue kering, bumbu cilok, bumbu balado, dan pecel sayur.

Kandungan gizi yang terdapat dalam 100 g kacang tanah yaitu karbohidrat (21 g), air (4,26 g), protein (25 g), gula (0 g), serat (9 g), lemak (48 g), vitamin A (0 g), Vitamin C (0 g), vitamin D (0 g), vitamin E (6,6 mg), vitamin K (1,9 ug). Manfaat kacang tanah bagi kesehatan, yaitu membantu mencegah risiko diabetes, mencegah pembentukan batu empedu, menurunkan risiko stroke, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan kulit, mencegah kanker perut, mencegah depresi (Dickson 2021).

Pertumbuhan dan hasil kacang tanah dapat ditingkatkan antara lain dengan cara pemberian ekstrak *Azolla pinnata* pada media tanam dan perendaman biji kacang tanah dengan air kelapa. *Azolla* dapat menyediakan unsur nitrogen bagi tanaman, karena Cyanobacteria terdapat pada *Azolla* sehingga dapat melakukan simbiosis mutualisme yang dikenal dengan *Anabaena azollae*. N₂ bebas dapat difiksasi oleh *Anabaena azollae* sehingga N tersedia bagi tanaman (Sudjana 2014).

Air kelapa mengandung zat pengatur tumbuh kinetin, zeatin, auksin, juga vitamin, mineral, dan sumber karbon yang berguna untuk multiplikasi tunas in vitro. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah (< 1 mM) mendorong, menghambat, atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan dikendalikan beberapa golongan zat yang secara umum dikenal sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon (Anjarsari 2008). Kandungan sitokinin dan auksin pada air kelapa muda lebih tinggi dibanding air kelapa tua. Di samping itu hara makro N, P, dan K, dan hara mikro yang terdapat pada air kelapa muda berpotensi sebagai sumber karbon dalam bentuk sukrosa (Kristina dan Syahid 2012).

Azolla dan air kelapa mudah diperoleh karena merupakan limbah hasil pertanian, juga harganya relatif murah dibandingkan penggunaan zat pengatur tumbuh sintetik buatan pabrik. Oleh sebab itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian *azolla* dan air kelapa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai bulan April 2019 di lahan percobaan Asrama IPB

Sukasari, Jalan Siliwangi no. 17, Bogor Timur, Kota Bogor.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang diulang 3 kali. Faktor pertama yang diuji adalah dosis pembenaman *Azolla pinnata* pada media tanam kacang tanah (massa media tanam/mmt) yang mengacu pada Danuarti (2017). Taraf faktor pertama adalah A₀ = 0% mmt (0 g per polybag), A₁ = 1% mmt (200 g per polybag), A₂ = 1,5% mmt (300 g per polybag), A₃ = 2% mmt (400 g per polybag). Faktor kedua yang diuji adalah lama waktu perendaman benih kacang tanah dalam air kelapa yang berpedoman pada Ratnawati *et al.* (2013). Air kelapa yang digunakan pada penelitian ini adalah air kelapa muda, karena menurut hasil penelitian terdahulu kelapa muda memiliki kandungan ZPT maupun nutrisi lebih baik daripada air kelapa tua. Taraf faktor kedua adalah B₀ = tanpa perendaman, B₁ = 6 jam, B₂ = 12 jam, dan B₃ = 24 jam. Dengan demikian, terdapat 16 kombinasi perlakuan yang diulang 3 kali, sehingga diperoleh 48 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri atas 3 tanaman, sehingga terdapat 144 amatan tanaman.

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, meteran, penggaris, polybag, ember, gembor, dan sekop mini. Bahan yang digunakan adalah benih kacang tanah, air kelapa, *A. pinnata*, tanah, kompos, pupuk urea, SP36, KCl dan dolomite.

Pembenaman *A. pinnata* pada media tanam dilakukan 14 hari sebelum benih kacang tanah ditanam. Hal tersebut dilakukan agar *A. pinnata* terdekomposisi dengan baik, sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan kacang tanah optimum (Daniarti 2017). Sebelum diaplikasikan, *A. pinnata* dicuci bersih terlebih dahulu dan dikeringkan. Pengeringan dilakukan untuk mempercepat proses dekomposisi pelepasan unsur hara dapat lebih dini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunawan dan Kartina (2012) bahwa pembenaman *A. pinnata* kering ke

dalam tanah lebih baik untuk mempercepat proses dekomposisi dan pelepasan unsur hara, sehingga fungsi tanaman sebagai pupuk hayati dapat memberikan hasil terbaik. Setelah kering, *A. pinnata* dimasukkan ke dalam media tanam sesuai dosis perlakuan yang telah ditetapkan. Proses pengeringan sebelum *A. pinnata* diaplikasikan dalam media tanam polibeg dilakukan 14 hari sebelum tanam bersamaan dengan pengolahan tanah.

Peubal⁴ yang diamati pada penelitian ini adalah tinggi tanaman (cm), jumlah daun, luas daun (cm), bobot segar tajuk (g), bobot kering tajuk (g), bobot segar akar (g), bobot kering akar (g),

jumlah polong, bobot polong (g), presentase ²¹ong hampa, dan presentase polong isi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis ragam dan diuji lanjut dengan DMRT (*Duncan's Multiple Range Test*) pada taraf 5% jika pengaruh perlakuan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

²⁵ Pengaruh pemberian *Azolla pinnata* dan lama perendaman air kelapa terhadap peubah tinggi tanaman tercermin dari hasil ⁴⁵ nilai rata-rata tinggi tanaman yang ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Tinggi kacang tanah umur 2-8 MST

Perlakuan	Umur Tanaman (cm)			
	2 MST	4 MST	6 MST	8 MST
<i>Azolla pinnata</i>				
0% mmt	10,44 ^a	17,29 ^a	25,11 ^a	32,03 ^a
1% mmt	10,80 ^b	17,82 ^b	25,48 ^{ab}	32,54 ^b
1,5% mmt	11,18 ^c	18,18 ^c	26,04 ^b	33,27 ^c
2% mmt	11,75 ^d	18,59 ^d	26,76 ^c	33,38 ^c
Perendaman air kelapa				
Tidak direndam	10,80 ^a	17,76 ^a	25,69 ^a	31,80 ^a
6 jam	10,85 ^a	17,88 ^{ab}	25,49 ^a	32,68 ^b
12 jam	10,89 ^a	18,08 ^b	25,64 ^a	33,33 ^c
24 jam	11,63 ^b	18,17 ^b	26,56 ^b	33,41 ^c

Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Tinggi tanaman kacang tanah pada 2-8 MST yang diberi perlakuan *Azolla pinnata* secara umum lebih tinggi dari yang tidak diberi perlakuan *Azolla pinnata*. Tinggi tanaman kacang tanah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan dosis *Azolla pinnata* yang diberikan. Tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman selama 24 jam lebih tinggi dari tanaman tanpa perlakuan perendaman sejak umur 2 MST, tanaman yang diberi perlakuan perendaman selama 12 jam lebih tinggi dari ⁶²tanaman tanpa perlakuan perendaman pada umur 4 MST dan 8 MST, sedangkan tanaman yang diberi perlakuan perendaman selama 6 jam lebih

tinggi dari tanaman tanpa perlakuan perendaman pada umur 8 MST. Tinggi tanaman kacang tanah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan lama perendaman (Tabel 1).

Padadosis *Azolla pinnata* sebesar 0% mmt dan 2% mmt, tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman 6 jam dan 24 jam lebih tinggi dibandingkan tanaman yang tidak diberi perlakuan perendaman. Pada dosis *Azolla pinnata* sebesar 1% mmt dan 1,5% ²⁰mt, tinggi tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman lebih tinggi dibandingkan yang tidak diberi perlakuan perendaman (Tabel 2).

Tabel 2. 51 nggi kacang tanah pada 8 MST pada berbagai dosis *Azolla pinnata* dan lama perendaman pada air kelapa

Perlakuan	<i>Azolla pinnata</i>			
	0% mmt	1% mmt	1,5% mmt	2% mmt
Tidak direndam	30.60 ^a	31.53 ^b	32.10 ^c	32.20 ^{cd}
6 jam	32.57 ^{cde}	32.60 ^{cdef}	32.80 ^{ef}	32.83 ^{ef}
12 jam	32.87 ^{ab}	33.00 ^{efg}	33.03 ^{efg}	33.20 ^{bc}
24 jam	33.53 ^{gh}	33.53 ^{gh}	33.93 ^{hi}	34.53 ⁱ

Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Pengaruh pemberian *Azolla pinnata* dan lama perendaman air kelapa terhadap peubah jumlah daun dan luas daun tercermin berdasarkan hasil uji rata-rata jumlah daun dan luas daun yang ditampilkan pada Tabel 3.

2 Pada 2-6 MST jumlah daun tanaman kacang tanah 26 ng diberi perlakuan *Azolla pinnata* lebih banyak dibandingkan jumlah daun tanaman kacang tanah yang tidak diberi perlakuan *Azolla pinnata*. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi dosis *Azolla pinnata* yang

18 diberikan jumlah daun tanaman kacang tanah yang dihasilkan semakin banyak. Pada 2-6 MST jumlah daun tanaman kacang tanah yang diberi 26 perlakuan perendaman dengan air kelapa lebih banyak dibandingkan jumlah daun tanaman kacang tanah yang tidak diberi perlakuan perendaman. Ada kecenderungan bahwa semakin lama perlakuan perendaman dengan air kelapa yang diberikan jumlah daun tanaman kacang tanah yang dihasilkan semakin banyak (Tabel 3).

Tabel 3. 66 Jumlah daun kacang tanah umur 2-6 MST dan luas daun umur 4-8 MST 19

Perlakuan	Jumlah daun			Luas daun (cm)		
	2 MST	4 MST	6 MST	4 MST	6 MST	8 MST
<i>Azolla pinnata</i>						
0% mmt	18,25 ^a	23,92 ^a	34,33 ^a	767,17 ^a	1022,83 ^a	1281,67 ^a
1% mmt	19,00 ^b	24,83 ^b	35,50 ^b	771,67 ^b	1027,33 ^b	1285,83 ^b
1,5% mmt	19,25 ^b	25,92 ^c	36,08 ^b	773,33 ^{bc}	1030,66 ^c	1289,00 ^{bc}
2% mmt	20,17 ^c	26,75 ^d	36,92 ^c	776,17 ^c	1032,66 ^c	1292,83 ^c
Perendaman air kelapa						
Tidak direndam	17,67 ^a	24,08 ^a	33,50 ^a	767,67 ^a	1024,50 ^a	1284,17 ^a
6 jam	18,92 ^b	25,17 ^b	34,00 ^a	771,67 ^b	1026,17 ^{ab}	1285,33 ^a
12 jam	19,58 ^b	25,58 ^b	37,17 ^b	772,83 ^{bc}	1028,83 ^b	1287,67 ^a
24 jam	20,50 ^c	26,58 ^c	38,17 ^b	776,17 ^c	1034,00 ^c	1292,17 ^b

Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

2 Daun tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 22 jam lebih luas dibandingkan daun tanaman kacang tanah yang tidak diberi perlakuan perendaman pada semua umur. Daun tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman

dengan air 2 kelapa selama 12 jam lebih luas dari daun tanaman kacang tanah yang tidak diberi perlakuan perendaman pada umur 4 MST dan 6 MST. Daun tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan perendaman dengan air 2 kelapa selama 6 jam lebih luas dari daun tanaman kacang tanah yang tidak

diberi perlakuan perendaman hanya pada umur 4 MST (Tabel 3).

Indikasi adanya pengaruh pemberian *Azolla pinnata* dan lama perendaman air kelapa terhadap peubah

31 bobot segar dan kering tajuk serta bobot segar dan kering akar terlihat pada Tabel 4.

14 Tabel 4. Bobot segar dan kering tajuk serta 43 bobot segar dan kering akar kacang tanah

Perlakuan	Bobot Tajuk Tanaman (g)		Bobot Akar Tanaman (g)	
	Bobot Segar	Bobot Kering	Bobot Segar	Bobot Kering
<i>Azolla pinnata</i>				
0% mmt	41,83 ^a	20,58 ^a	13,44 ^a	3,64
1% mmt	42,75 ^b	21,42 ^b	13,78 ^{ab}	3,69
1,5% mmt	43,00 ^b	22,08 ^{bc}	14,15 ^b	3,73
2% mmt	43,42 ^b	22,75 ^c	14,93 ^c	3,78
Perendaman air kelapa				
Tidak direndam	42,58 ^a	21,00 ^a	12,90 ^a	3,64
6 jam	42,17 ^a	21,25 ^{ab}	13,26 ^a	3,69
12 jam	42,25 ^a	21,92 ^{bc}	14,48 ^b	3,74
24 jam	44,00 ^b	22,67 ^c	15,67 ^c	3,76

Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

2 Bobot segar tajuk tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan *Azolla pinnata* 2 bih berat dibandingkan bobot segar tajuk tanaman kacang tanah yang tidak diberi perlakuan *Azolla pinnata*, tetapi di antara dosis *Azolla pinnata* tidak ada perbedaan bobot segar tajuk. Perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 24 jam mampu meningkatkan bobot segar tajuk, sedangkan perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 6 dan 12 jam belum mampu meningkatkan bobot segar 2 juk (Tabel 4).

Bobot kering tajuk tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan *Azolla pinnata* 2 bih berat dibandingkan bobot kering tajuk tanaman kacang tanah yang tidak diberi perlakuan *Azolla pinnata*. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi dosis *Azolla pinnata* yang diberikan maka bobot kering tajuk tanaman yang dihasilkan semakin berat. Perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 12 jam dan 24 jam mampu meningkatkan bobot kering tajuk, sedangkan perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 6 jam belum mampu meningkatkan bobot kering tajuk. Ada kecenderungan bahwa semakin lama perlakuan perendaman dengan air kelapa

yang diberikan semakin berat bobot kering tajuk tanaman kacang tanah yang dihasilkan (Tabel 4).

Perlakuan pemberian *Azolla pinnata* dengan dosis 1,5% mmt dan 2% mmt mampu meningkatkan bobot segar akar tanaman kacang tanah, namun pemberian *Azolla pinnata* pada semua dosis yang dicoba tidak mampu meningkatkan bobot kering akar. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi dosis *Azolla pinnata* yang diberikan maka bobot segar akar yang dihasilkan semakin berat. Perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 6 jam belum mampu meningkatkan bobot segar akar, sedangkan perlakuan perendaman selama 12 jam dan 24 jam mampu meningkatkan bobot segar akar. Perbedaan lama perendaman dengan air kelapa tidak menghasilkan perbedaan bobot kering akar (Tabel 4).

Adanya pengaruh pemberian *Azolla pinnata* dan lama perendaman air kelapa terhadap peubah jumlah, bobot polong, presentase polong isi, presentase polong hampa dan jumlah bintil dapat diketahui berdasarkan hasil uji rata-rata yang disajikan pada Tabel 5.

Jumlah polong tanaman kacang tanah yang mendapat perlakuan *Azolla pinnata* 1,5% mmt dan 12% mmt lebih banyak dibandingkan jumlah polong kacang tanah yang tidak mendapat perlakuan *Azolla pinnata*. Perlakuan perendaman dengan air kelapa selama 12 jam dan 24 jam memberikan jumlah polong

lebih banyak dibandingkan perlakuan tanpa perendaman. Sementara itu bobot polong kacang tanah tidak terpengaruh oleh perlakuan *Azolla pinnata* maupun perendaman dengan air kelapa, bobot polong pada semua perlakuan tidak berbeda nyata (Tabel 5).

Tabel 5 Jumlah dan bobot polong, presentase polong isi dan hampa, serta jumlah bintil kacang tanah

Perlakuan	Polong tanaman				Jumlah Bintil
	Jumlah	Bobot (g)	% polong isi	% polong hampa	
<i>Azolla pinnata</i>					
0% mmt	4,83 ^a	17,42	85,35 ^a	14,65 ^b	6,92 ^a
1% mmt	5,17 ^{ab}	17,49	85,26 ^a	14,74 ^b	7,58 ^{ab}
1,5% mmt	5,58 ^{bc}	17,54	86,19 ^{ab}	14,39 ^b	7,75 ^b
2% mmt	5,75 ^c	17,62	87,70 ^b	12,30 ^a	8,33 ^b
Perendaman air kelapa					
Tidak direndam	4,75 ^a	17,55	83,37 ^a	12,53 ^a	6,58 ^a
6 jam	5,08 ^{ab}	17,52	86,06 ^b	12,98 ^a	7,50 ^b
12 jam	5,58 ^{bc}	17,49	87,03 ^{bc}	13,94 ^a	8,17 ^{bc}
24 jam	5,91 ^c	17,51	88,05 ^c	16,63 ^b	8,33 ^c

Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Perlakuan *Azolla pinnata* pada dosis 2% mmt mampu meningkatkan persentase polong isi dan menurunkan persentase polong hampa, sedangkan perlakuan *Azolla pinnata* pada taraf yang lain belum memberikan hasil yang berbeda dengan hasil tanpa perlakuan *Azolla pinnata*. Perlakuan *Azolla pinnata* dengan dosis 1,5% mmt dan 2% mmt juga mampu meningkatkan jumlah bintil akar. Perlakuan lama perendaman dengan air kelapa selama 24 jam mampu meningkatkan persentase polong isi dan menurunkan persentase polong hampa. Perlakuan perendaman benih dengan air kelapa selama 6, 12, dan 24 jam juga mampu meningkatkan jumlah bintil akar (Tabel 5).

Pembahasan

Pemberian *Azolla pinnata* pada media dan perendaman benih dengan air kelapa berpengaruh pada tinggi tanaman, tanaman kacang tanah yang mendapat perlakuan *Azolla pinnata* maupun yang mendapat perlakuan perendaman benih

dengan air kelapa lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang tanah pada perlakuan kontrol. Hal ini sejalan dengan penelitian Daniarti (2017) yang menyatakan bahwa *Azolla pinnata* mengandung nitrogen yang berpengaruh terhadap organ vegetatif utama tanaman, pemberian *Azolla pinnata* pada berbagai dosis memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk nitrogen ke dalam tanah akan meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman, semakin tinggi pupuk nitrogen yang diberikan sampai suatu batas tertentu semakin tinggi pula variabel pertumbuhan tanaman, dalam hal ini terutama pada tinggi tanaman (Sutedjo dan Kartasapoetra 1990). Kandungan kinetin yang terdapat di dalam air kelapa dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis sehingga memacu pertumbuhan dan meningkatkan produksi tanaman (Ariyanti *et al.* 2019).

Pertumbuhan jumlah dan luas daun tanaman yang diberi perlakuan *Azolla pinnata* dan air kelapa lebih cepat daripada tanpa pemberian *Azolla pinnata* dan air

kelapa. Hasil penelitian Mayura *et al.* (2016) air kelapa mengandung Ca dan vitamin yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan daun.

Bobot segar dan kering tajuk tanaman dengan pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa lebih besar daripada tanpa pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa. Menurut Suryati *et al.* (2015 Sudjana) pemberian *Azolla pinnata* sebagai pupuk organik pada suatu tanaman mampu mensuplai unsur hara yang diserap tanaman terutama unsur N, P dan K. Hasil penelitian Rover (2006) menyatakan bahwa pemberian air kelapa muda pada tanaman kedelai berpengaruh terhadap diameter batang, jumlah cabang primer, umur berbunga, jumlah polong pertanaman, jumlah polong bernas pertanaman, berat kering 100 biji, hal itu disebabkan air kelapa selain mengandung mineral juga mengandung hormon sitokinin, fosfor, dan kinetin yang berfungsi memperlancar pembelahan sel dan mempunyai pengaruh terhadap perkecambah dan pertumbuhan di antaranya pertumbuhan tunas dan akar. Dengan demikian air kelapa baik untuk pertumbuhan bobot segar dan kering tajuk tanaman.

Bobot segar akar tanaman dengan pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa lebih besar dibandingkan tanpa pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa. Dengan pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa pertumbuhan akar lebih baik daripada tanpa pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa.

Azolla pinnata merupakan penyedia nitrogen, kalium, dan fosfor yang lebih banyak dibandingkan pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, dan pupuk kascing, yang bermanfaat dalam hal pembentukan polong sehingga dapat mempengaruhi produksi polong yang dihasilkan. Pemberian bahan organik dapat menyediakan unsur nitrogen, kalium, kalsium dan ketersediaan unsur fosfor yang mudah larut dalam tanah, yang cukup diperlukan tanaman kacang tanah untuk perkembangan polongnya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang

dilakukan Indria (2005) bahwa jumlah polong tanaman dipengaruhi oleh pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa.

Persentase polong isi, persentase polong hampa, dan jumlah bintil akar tanaman dengan pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa lebih baik daripada tanpa pemberian *Azolla pinnata* dan air kelapa. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang mengemukakan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dan mencapai tingkat produksi tinggi apabila unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam keadaan cukup dan berimbang dalam tanah. Meningkatnya unsur hara nitrogen dalam tanah akan meningkatkan unsur hara yang lainnya juga, sehingga ketersediaan karbohidrat akan meningkat yang dapat digunakan untuk memproduksi bobot biji menjadi lebih berat (Lubis *et al.* 2013).

Azolla pinnata berfungsi sebagai penyumbang unsur hara makro, terutama nitrogen yang terakumulasi pada massa media tanaman yang telah mengalami dekomposisi lanjut, selain unsur nitrogen juga terdapat unsur makro dan mikro. Unsur Nitrogen lebih banyak terdapat daripada unsur makro lainnya pada media massa *Azolla pinnata* dikarenakan tanaman ini dapat bersimbiosis mutualisme dengan *Anabaena azollae*, yaitu ganggang hijau biru yang mempunyai enzim nitrogenase yang dapat merubah nitrogen hasil fiksasi menjadi amonia, dan amonia diangkut oleh *Azolla pinnata* kemudian dirubah menjadi asam amino dan digunakan untuk fotosintesis.

Air kelapa berperan sebagai penghasil zat pengatur tumbuh alami, umumnya dari golongan auksin, sitokinin, dan geberellin. Auksin dapat menstimulir komponen dari pertumbuhan tanaman terutama pada bagian ujung apikal titik tumbuh dan akar, sedangkan sitokinin menstimulir pertumbuhan tunas samping. Giberelin berperan dalam pemanjangan sel, antara lain pada pertambahan tinggi tanaman..

Total unsur nitrogen yang dapat difiksasi melalui simbiosis *Azolla pinnata*-

Anabaena azollae cukup tinggi. Penambahan nitrogen (N_2) sebesar 7,2 - 7,8 mg N_2 per gram berat/kering (Kuncarawati *et al.* 2005). *Azolla* sangat efektif digunakan sebagai pupuk organik untuk mempertahankan kesuburan tanah, setiap hektar sawah memerlukan *azolla* sejumlah 20 ton dalam keadaan kering. Bila *azolla* diberikan setiap musim tanam, maka tingkat pemakaian pupuk buatan akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan pada pemberian pertama seperempat bagian unsur yang dikandung *azolla* langsung dimanfaatkan oleh tanah. Seperempat bagian ini setara dengan 65 kg pupuk urea. Pada musim tanam ke-2 dan ke-3, *azolla* mensubsitusikan seperempat sampai sepertiga dosis pemupukan. Penggunaan *azolla* sebagai pupuk, selain dalam bentuk segar, baik juga dalam bentuk kering dan kompos (Fitria 2015). Air kelapa selain mengandung ZPT, yakni: auksin, giberelin, dan sitokinin, juga mengandung nutrisi yang paling tinggi kadarnya adalah kalium. Kalium berperan pada proses pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan laju fotosintesis, sehingga terjadi peningkatan hasil fotosintat yang diperlukan tanaman dalam proses pertumbuhan, seperti tinggi tanaman, luas daun, dan bobot segar dan kering tajuk (Wijaya 2019).

KESIMPULAN

Perlakuan pemberian *Azolla pinnata* terutama pada dosis 2% massa media tanam dan perendaman benih kacang tanah dalam air kelapa terutama selama 24 jam berhasil meningkatkan pertumbuhan dan hasil kacang tanah. Peningkatan pertumbuhan hasil kacang tanah meliputi peubah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot segar dan kering tajuk, bobot segar akar, jumlah polong, persentase polong isi, dan jumlah bintil akar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti M, Rosniawaty S, Permana MR. 2019. Respons pertumbuhan tanaman kelapa belum menghasilkan terhadap pemberian air kelapa dan asam humat. *Kultivasi UNPAD*. 18(3):996-1003.
- Daniarti H, Milawati M, Sulistiono. 2017. Pengaruh dosis dan waktu aplikasi *Azolla* sp. terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* (L.) Merr.). *Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*. 4(1):19-25
- Anjarsari IRD. 2008. Peranan dan Fungsi Fitohormon bagi Pertumbuhan Tanaman. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/makalah_fitohormondf.
- Dickson. 2021. Kandungan Gizi Kacang Tanah dan Manfaat Kacang Tanah bagi Kesehatan.
- Fitria E. 2015. *Azolla*, Tanaman Paku Air yang Menguntungkan Padi Sawah. nada.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-teknologi/776-azolla-tanaman-paku-air-yang-menguntungkan-padi-sawah.
- Gunawan I, Kartina R. 2012. Substitusi kebutuhan nitrogen tanaman padi sawah oleh tumbuhan air *azolla* (*Azolla pinnata*). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*. 12(3): 175-180
- Indria. 2005. Pengaruh Dosis dan Waktu aplikasi *Azolla pinnata* Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman (*Arachis hypogaea* (L.) Merr.) [Skripsi]. Kediri [ID] : PGRI Kediri.
- Kristina NV, Syahid SF. 2012. Pengaruh air kelapa terhadap multiplikasi tunas *in vitro*, produksi rimpang, dan kandungan xanthorrhizol temulawak di lapangan. *Jurnal Litri* 18(3):125-134
- Kuncarawati IL, Husen S, Rukhiyat M. 2005. Aplikasi teknologi pupuk organik *azolla* pada budidaya padi

- sawah di Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blita. *Dedikasi*. 3:10-16.
- Lubis AI, Jumini, Syafruddin. 2013. Pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah (*Arachis hypogea* L.) akibat pengaruh dosis pupuk N dan P pada kondisi media tanam tercemar hidrokarbon. *Agrista* 17(3): 119-126
- Mayura E, Yudafis, Herwita I, Darwati I. 2016. Pengaruh pemberian air kelapa dan frekuensi pemberian terhadap pertumbuhan benih cengkeh. *Bul Littro*. 27(2):123-124
- Ratnawati, Saputra SI, Yoseva S. 2013. Waktu Perendaman Benih Dengan Air Kelapa Muda Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao (*Theobroma cacao* L.). <https://media.neliti.com/media/publications/201097-waktu-perendaman-benih-dengan-air-kelapa.pdf>.
- Rover. 2006. Pengaruh Jarak Tanam dan Pemberian Air Kelapa Muda Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (*Glycine max* L. Merr) [Skripsi]. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Sudjana B. 2014. Penggunaan azolla untuk pertanian berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Solusi*. 1(2):72-81.
- Suryati D, Sampurno, Edison A. 2015. Uji beberapa konsentrasi pupuk cair azolla (*Azolla pinnata*) pada pertumbuhan bibit kelapa sawit (*Elaeisguineensis* Jacq.) di pembibitan utama. *Jurnal Online mahasiswa Fakultas Pertanian*. (2)1:1-13.
- Sutedjo M. 1990. *Pupuk dan Cara Pemupukan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijaya. 2019. Pertumbuhan dan hasil kacang hijau (*Phaseol(2us radiatus* L.) dengan pemberian air kelapa. *Agroteknologi Tropika Lembab*. 1(2):100-105

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK GULMA *Azolla pinnata* DAN LAMA PERENDAMAN AIR KELAPA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG TANAH

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	proceeding.unindra.ac.id Internet	61 words — 1%
2	pengaruhcahayaterhadap.blogspot.com Internet	60 words — 1%
3	www.jurnal.umuslim.ac.id Internet	47 words — 1%
4	Repositori.Usu.Ac.Id Internet	34 words — 1%
5	adoc.tips Internet	32 words — 1%
6	jurnal.unswagati.ac.id Internet	32 words — 1%
7	jurnal.unej.ac.id Internet	29 words — 1%
8	repository.unpas.ac.id Internet	29 words — 1%
9	etd.eprints.ums.ac.id Internet	27 words — 1%

10	repository.unsoed.ac.id Internet	24 words — 1%
11	repository.usu.ac.id Internet	24 words — 1%
12	Filsafat Waruwu, Bilman Wilman Simanihuruk, Prasetyo Prasetyo, Hermansyah Hermansyah. "PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT DI PRE-NURSERY DENGAN KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN KONSENTRASI PUPUK CAIR <i>Azolla pinnata</i> BERBEDA", Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia, 2018 Crossref	22 words — 1%
13	jurnal.um-palembang.ac.id Internet	22 words — 1%
14	eprints.unram.ac.id Internet	21 words — < 1%
15	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet	21 words — < 1%
16	repository.iba.ac.id Internet	21 words — < 1%
17	biologigonz.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
18	dokterdewikusumastuti.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
19	jurnal.peipfi-komdasulsel.org Internet	18 words — < 1%
20	jurnal.untan.ac.id	

18 words — < 1%

-
- 21 Yohan Yogaswara, Radix Suharjo, Suskandini Ratih Dirmawati, Cipta Ginting. "UJI KEMAMPUAN ISOLAT JAMUR *Trichoderma* spp. SEBAGAI ANTAGONIS *Ganoderma boninense* DAN PLANT GROWTH PROMOTING FUNGI (PGPF)", *Jurnal Agrotek Tropika*, 2020
- Crossref

-
- 22 jurnal.ugj.ac.id
- Internet
- 17 words — < 1%

-
- 23 Eisal Vepin Nainggolan, Yudhi Harini Bertham, Sigit Sudjatmiko. "PENGARUH PEMBERIAN PUPUK HAYATI MIKORIZA DAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG PANJANG (*Vigna sinensis* L.) DI ULTISOL", *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 2020
- Crossref

-
- 24 M Y Hardiansyah, A N K Amas, Y Musa, A M Jaya. "Comparative evaluation of cocoa seeds germination in local variety Gantarangkeke Bantaeng (GTB) with MCC 01 variety using seed priming treatment", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021
- Crossref

-
- 25 Maximus Ulu, Roberto I.C.O. Taolin, Regina Seran. "Pengaruh Jenis Media Tanam Dan Lama Perendaman Benih Dalam Air Hangat Terhadap Bibit Pepaya (*Carica papaya* L.)", *Savana Cendana*, 2019
- Crossref

-
- 26 arivanipotter.wordpress.com
- Internet
- 16 words — < 1%

27 Irwan Effendi, Aditya Pranata, Feliatra. " The Effect of Sun Light Intensity on the Growth of and its Symbiont in Brackish Water ", Journal of Physics: Conference Series, 2019

Crossref

15 words — < 1%

28 doaj.org
Internet

15 words — < 1%

29 repository.ump.ac.id
Internet

15 words — < 1%

30 sinta3.ristekdikti.go.id
Internet

15 words — < 1%

31 A. Marthin Kalay, Gratiana NC Tuhumury, Novalina Pesireron, Abraham Talaharuruson. "Control of Damping off and Increased Growth of Tomato Seeds by Utilizing Trichoderma harzianum Based on Solid Organic Materials", Agrologia, 2019

Crossref

13 words — < 1%

32 www.coursehero.com
Internet

13 words — < 1%

33 Purwanti Pratiwi Purbosari, Etika Dyah Puspitasari. "PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN TAPAK DARA (Catharanthus roseus L.) DAN KOLKISIN TERHADAP PERKECAMBAHAN BIJI CABAI RAWIT HIBRIDA (Capsicum annum)", BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi), 2018

Crossref

12 words — < 1%

34 garuda.ristekdikti.go.id
Internet

11 words — < 1%

35 Benny Winson Maryanto Saragih, Nanik Setyowati, Prasetyo Prasetyo, Uswatun Nurjanah. 10 words — < 1%
Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2020
Crossref

36 Riny R Tiwery. "PENGARUH PENGGUNAAN AIR KELAPA (Cocos nucifera) TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.)", BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan dan Terapan, 2014 10 words — < 1%
Crossref

37 Stenly Jacob Wenno, H Sinay. "KADAR KLOOROFIL DAUN PAKCOY (BRASSICA CHINENSIS L.) SETELAH PERLAKUAN PUPUK KANDANG DAN AMPAS TAHU SEBAGAI BAHAN AJAR MATA KULIAH FISILOGI TUMBUHAN", Biopendix: Jurnal Biologi, Pendidikan dan Terapan, 2019 10 words — < 1%
Crossref

38 edoc.pub 10 words — < 1%
Internet

39 ilmupengetahuanumum.com 10 words — < 1%
Internet

40 jtsl.ub.ac.id 10 words — < 1%
Internet

41 repository.ipb.ac.id:8080 10 words — < 1%
Internet

42 Felix Nahak Berek, Eduardus Yosef Neonbeni. "Pengaruh Jenis Biochar dan Takaran Pupuk Kandang Sapi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau (Vigna radiata L.)", Savana Cendana, 2018 9 words — < 1%
Crossref

-
- 43 [Repository.umi.ac.id](https://repository.umi.ac.id) Internet 9 words — < 1%
-
- 44 Tri Ernawati, Linda Ch. M. Karisoh, Rahmawaty Hadju, Surtijono E. Siswosubroto. "PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN DAUN JAMBU BIJI (*Psidium guajava*) DAN LAMA PERENDAMAN TERHADAP KUALITAS TELUR AYAM RAS", ZOOTEK, 2019
Crossref 9 words — < 1%
-
- 45 ejournal.akprind.ac.id Internet 9 words — < 1%
-
- 46 ejurnal.undana.ac.id Internet 9 words — < 1%
-
- 47 repositori.unsil.ac.id Internet 9 words — < 1%
-
- 48 www.dovepress.com Internet 9 words — < 1%
-
- 49 www.researchgate.net Internet 9 words — < 1%
-
- 50 Asih Fitriana Dewi. "PENGARUH VARIASI DOSIS LARUTAN DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) TERHADAP MORTALITAS LARVA NYAMUK *Aedes sp.* SEBAGAI SUMBERBELAJAR BIOLOGI", BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi), 2016
Crossref 8 words — < 1%
-
- 51 Djuhria Wonggo, Eunike Louisje Mongi, Silvana Dinaintang Harikedua. "APLIKASI AIR KELAPA SEBAGAI ADITIF ALAMI BAGI PENINGKATAN MUTU PRODUK 8 words — < 1%

CAKALANG ASAP (CAKALANG FUFU) KHAS SULAWESI UTARA",
MEDIA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN, 2018

Crossref

52 Hortikultura.litbang.pertanian.go.id 8 words — < 1%
Internet

53 Isna Tustiyani. "Pengaruh Pemberian Berbagai Zat Pengatur Tumbuh Alami terhadap Pertumbuhan Stek Kopi", JURNAL PERTANIAN, 2017 8 words — < 1%
Crossref

54 Syprianus Ceunfin, Maria Ursula Humoen, Sonya M. A. Boyfala, Apriana H. Seran, Adrianus Lelang. "Pengaruh Model Defoliasi Daun Jagung dan Jumlah Benih terhadap Hasil Jagung dan Kacang Nasi pada Sistem Tumpang Sari Salome (Kearifan Lokal Timor)", Savana Cendana, 2018 8 words — < 1%
Crossref

55 ar.scribd.com 8 words — < 1%
Internet

56 journal.unj.ac.id 8 words — < 1%
Internet

57 jurnal.untad.ac.id 8 words — < 1%
Internet

58 laporanakhirskripsitesisdisertasimakalah.wordpress.com 8 words — < 1%
Internet

59 repository.uki.ac.id 8 words — < 1%
Internet

60	Internet	8 words — < 1%
61	Alim Perdana Kusuma, Nurlianti Pertiwi, Eka Suzanna. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021 Crossref	7 words — < 1%
62	ejournal.unklab.ac.id Internet	7 words — < 1%
63	holiskakashi.blogspot.com Internet	7 words — < 1%
64	jurnal.utu.ac.id Internet	7 words — < 1%
65	Asfaruddin Asfaruddin, Sunarti Sunarti, Tenzi Mardalena. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021 Crossref	6 words — < 1%
66	Riri Hartati Hutagalung, Tengku Boumedine Hamid Zulkifli, Irwan Agusnu Putra, Dedi Kurniawan. "Pemanfaatan Pupuk Kandang Ayam, Pupuk Kalium dan Magnesium terhadap Pertumbuhan Jagung Manis (Zea mays saccharata Strut)", Agrinula : Jurnal Agroteknologi dan Perkebunan, 2019 Crossref	6 words — < 1%
67	journal.uinsgd.ac.id Internet	6 words — < 1%

