

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Karya Ilmiah	: Karakterisasi Morfologi dan Biokimia Aksesi Pamelo { <i>Citrus maxima</i> (Burm) Merr.} Berbiji dan Tidak Berbiji Asli Indonesia		
Jumlah Penulis	: 4 Orang		
Status Pengusul	: Penulis Pertama		
Identitas Prosiding	a. Nama Prosiding b. ISBN/ISSN c. Tahun Terbit, Lokasi d. Halaman/Penerbit e. Repository/Web f. Terindeks di	: Seminar Nasional PERHORTI 2012 : 9789792512656 : 05 Desember 2013, Bogor : 5-15 / IPB Scientific Repository : https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66385 : Google Scholar, SINTA, IPB Repository	

Kategori Publikasi Karya Ilmiah :
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan Unsur Isi Buku (10%)		1	1
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)		3	3
c. Kecukupan & Kemutahiran Data/Informasi & Metodologi (30%)		3	2
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/Prosiding (30%)		3	2
Total = (100%)		10	8

CATATAN PENILAIAN ARTIKEL OLEH REVIEWER:

1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur Isi Prosiding :

Lengkapnya materi morfologi buah brotis palem
cukup baik

2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan :

Ruang lingkup pembahasan karakteristik palem cukup baik

3. Kecukupan & Kemutahiran Data/Informasi & Metodologi :

Kemutahiran sbr. seputar ush hrg, tipei ukuloh.
gg dgn cukup baik.

4. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan :

Penerjemah adalah Simin PERKAH → Skala Normal

Reviewer 1,

Dr. Ir. Anggraeni, M.Si

NIK/NIDN : 0006076301

Jabatan Fungsional/Pangkat : Lektor Kepala, Pembina IV/a
Unit Kerja : Universitas Djunda

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Karya Ilmiah	: Karakterisasi Morfologi dan Biokimia Akses Pamelo (<i>Citrus maxima</i> (Burm) Merr.) Berbiji dan Tidak Berbiji Asli Indonesia	
Jumlah Penulis	4 Orang	
Status Pengusul	Penulis Pertama	
Identitas Prosiding	a. Nama Prosiding b. ISBN/ISSN c. Tahun Terbit, Lokasi d. Halaman/Penerbit e. Repository/Web f. Terindeks di	: Seminar Nasional PERHORTI 2012 : 9789792512656 : 05 Desember 2013, Bogor : 5-15 / IPB Scientific Repository : https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66385 : Google Scholar, SINTA, IPB Repository

Kategori Publikasi Karya Ilmiah :
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan Unsur Isi Buku (10%)		1	1
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)		3	3
c. Kecukupan & Kemutahiran Data/Informasi & Metodologi (30%)		3	2
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/Prosiding (30%)		3	2
Total = (100%)		10	8

CATATAN PENILAIAN ARTIKEL OLEH REVIEWER:

1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur Isi Prosiding :

isi prosiding lengkap & sesuai

2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan :

Ruang lingkup & pembahasan mendalam

3. Kecukupan & Kemutahiran Data/Informasi & Metodologi :

Data masih kurang. tetapi metodologi cukup baik

4. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan :

Unsur-is terbitan cukup baik

Reviewer 2,

Dr. Ir. Deden Sudrajat, M.Si

NIK/NIDN : 0004096501

Jabatan Fungsional/Pangkat : Lektor Kepala, Pembina IV/a
Unit Kerja : Universitas Djuanda

LEMBAR
REKAPITULASI PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG / PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Karya Ilmiah	: Karakterisasi Morfologi dan Biokimia Akses Pamelon (<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.) Berbiji dan Tidak Berbiji Asli Indonesia	
Jumlah Penulis	: 4 Orang	
Status Pengusul	: Penulis Pertama	
Identitas Prosiding	a. Nama Prosiding b. ISBN/ISSN c. Tahun Terbit, Lokasi d. Halaman/Penerbit e. Repository/Web f. Terindeks di	: Seminar Nasional PERHORTI 2012 : 9789792512656 : 05 Desember 2013, Bogor : 5-15 / IPB Scientific Repository : https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66385 : Google Scholar, SINTA, IPB Repository
Kategori Publikasi Karya Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)	<input type="checkbox"/> Prosiding Forum Ilmiah Internasional <input checked="" type="checkbox"/> Prosiding Forum Ilmiah Nasional	

Hasil Penilaian Peer Review :

Nilai Prosiding		
Peer Review 1	Peer Review 2	Nilai Rata-Rata
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>
KESIMPULAN :		
Nilai Karya Ilmiah Yang Diusulkan Ke Kopertis Wilayah IV Adalah : 8 /		

Karakterisasi Morfologi dan Biokimia Aksesi Pamelo {*Citrus maxima* (Burm.) Merr.} Berbiji dan Tidak Berbiji Asli Indonesia

No Thumbnail

[View/Open](#)

-  PRO2012_SSU.pdf (1.074Mb)
-  Cover Perhorti 2012.jpg (278.5Kb)
-  Cover Perhorti 2012.jpg (278.5Kb)

Date

2013

Author

Rahayu, Arifah

Susanto, Slamet

Purwoko, B. S.

Dewi, I. S.

Metadata

[Show full item record](#)

Abstract

The objective of this work was to evaluate morphological and biochemical (isozyme) characters of seeded and seedless pummelo accessions originated from Sumedang, Pati, Kudus and Magetan. Morphological characters contributed in grouping pummelo accessions were epicarp thickness, leaf lamina margin, vesicle length, epicarp color, petiole wing width and fruit shape, while isozyme characters were MDH (Rf 0,11 and 0,14) and ACP (Rf 0,24 and 0,33). ACP band at Rf 0,24 could be used as marker to differentiate seeded and seedless pummelo accessions. Separation between seeded and seedless accessions based on morphological characters occurred at similarity coefficient of 0,63, while on isoenzyme characters occurred at similarity coefficient of 0,49. Dendrogram based on combined morphological and isoenzyme data was able to differentiate seed bearing and seedless pummelo accessions. Principal component analysis results was congruent with that of morphological, isozyme, and combination of them.

URI

<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66385>

Collections

Agronomy and Horticulture [595]

**KARAKTERISASI MORFOLOGI DAN BIOKIMIA AKSESI PAMELO
{Citrus maxima (Burm.) Merr.} BERBIJI DAN TIDAK BERBIJI
ASLI INDONESIA**

Arifah Rahayu¹, Slamet Susanto², Bambang S. Purwoko², Iswari S. Dewi³

¹Jurusan Agronomi Universitas Djuanda Bogor

²Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB-Bogor

³Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumberdaya Genetik Pertanian
Email: arifahrahayu@yahoo.co.id

ABSTRACT

The objective of this work was to evaluate morphological and biochemical (isozyme) characters of seeded and seedless pummelo accessions originated from Sumedang, Pati, Kudus and Magetan. Morphological characters contributed in grouping pummelo accessions were epicarp thickness, leaf lamina margin, vesicle length, epicarp color, petiole wing width and fruit shape, while isozyme characters were MDH (Rf 0,11 and 0,14) and ACP (Rf 0,24 and 0,33). ACP band at Rf 0,24 could be used as marker to differentiate seeded and seedless pummelo accessions. Separation between seeded and seedless accessions based on morphological characters occurred at similarity coefficient of 0,63, while on isoenzyme characters occurred at similarity coefficient of 0,49. Dendrogram based on combined morphological and isozyme data was able to differentiate seed bearing and seedless pummeo accessions. Principal component analysis results was congruent with that of morphological, isozyme, and combination of them.

Key words: morphology, isoenzyme, pummelo, similarity coefficient

PENDAHULUAN

Pamelo *{Citrus maxima (Burm.) Merr.}* berasal dari Malesia, kemudian menyebar ke Indo-Cina, Cina Selatan, Jepang Selatan, India Barat, Mediterania dan Amerika Tropik (Niyomdham, 1992). Pusat produksi pamelo dunia terdapat di Cina bagian Selatan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Jepang (Hodgson, 1967). Di Indonesia, sentra produksi pamelo utama terdapat di Kabupaten Magetan, sedangkan sentra produksi potensial antara lain di Kabupaten Sumedang, Pati, Kudus, Pangkajene dan Kepulauan (Sulawesi Selatan) dan Bireun (Aceh). Di sentra-sentra produksi tersebut, terdapat berbagai kultivar pamelo yang beragam bentuk, ukuran, warna, rasa buah dan jumlah bijinya. Aksesi pamelo memiliki jumlah biji beragam, mulai dari tidak berbiji hingga berbiji banyak (Ladaniya, 2008). Buah tidak berbiji lebih banyak diminati oleh konsumen, karena biji menyebabkan rasa pahit dan merepotkan saat mengkonsumsi buah (Altaf dan Khan, 2007), sehingga pengembangan jeruk diarahkan pada aksesi tidak berbiji.

Upaya pengembangan aksesi tidak berbiji melalui program pemuliaan dan pemanfaatan plasma nutfah, memerlukan informasi keanekaragaman genetik dan hubungan kekerabatan antar kultivar pamelo. Informasi ini dapat diperoleh melalui karakterisasi.

Tahap awal identifikasi tanaman, biasanya dilakukan secara morfologi, karena adanya kemudahan dalam mengamati perbedaan antara tanaman secara visual. Selain itu kebanyakan karakter hortikultura penting dikendalikan oleh banyak gen (Campos *et al.*, 2005). Karakter morfologi merupakan ekspresi fenotipe dari individu dan populasi, diregulasi dan ditentukan oleh gen dan interaksinya dengan lingkungan. Beberapa peneliti telah menggunakan karakterisasi morfologi pada jeruk, antara lain untuk meningkatkan jumlah genotipe yang potensial dalam program pemuliaan atau untuk melepas kultivar baru jeruk keprok (*Citrus spp.*) (Koehler-Santos *et al.*, 2003; Campos *et al.*, 2005), untuk melihat kekerabatan genetik spesies jeruk (Hardiyanto *et al.* 2007), dan untuk mendapatkan kultivar unggul pamelo (Ara *et al.*, 2008).

Dalam melakukan karakterisasi morfologi perlu diperhatikan karakter yang dapat diturunkan, mudah diamati dengan mata telanjang, dan diekspresikan pada semua kondisi atau lingkungan (Perry dan Battencourt, 1997). Biasanya karakter ini bersifat kualitatif dan stabil pada berbagai kondisi lingkungan, contohnya warna bunga dan bentuk buah. Kelemahan penanda morfologi adalah dipengaruhi oleh tahap perkembangan tanaman dan lingkungan. Selain itu kadang-kadang sulit membedakan genotipe yang diamati, karena secara morfologi tampak sama, walaupun sebenarnya genotipe tersebut berbeda. Hal ini terjadi akibat sifat resesif tertutup oleh sifat dominan (Bakhtiar, 2002). Oleh karena itu hasil karakterisasi morfologi perlu didukung dengan metode lain, diantaranya secara biokimia dengan isoenzim.

Isoenzim merupakan enzim yang terdiri atas molekul-molekul yang mempunyai struktur kimia yang berbeda akan tetapi mengatalisis reaksi kimia yang sama. Sebagai protein, isoenzim secara langsung dapat menunjukkan perubahan dalam sekuen DNA melalui perbedaan komposisi asam amino. Seringkali perbedaan komposisi asam amino akan mengubah muatan enzim, yang akan menyebabkan perubahan dalam mobilitas elektroforesis (Weeden dan Wendel 1989). Hal ini merupakan indikator yang baik untuk keragaman genetik, sehingga isoenzim dapat digunakan untuk mengidentifikasi kultivar pamelo (Phan *et al.* 2008), *Citrus junos* dan kerabat jeruk asam (Rahman *et al.* 2001), membedakan bibit jeruk triploid dan diploid (King *et al.* 1996), dan batang bawah jeruk nuselar dan zigotik (Sykes 2011). Di lain pihak belum diketahui kemampuan isoenzim dalam membedakan antara aksesi berbiji dan tidak berbiji pada pamelo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter morfologi dan isoenzim aksesi pamelo yang dapat digunakan sebagai karakter dalam pengembangan pamelo tidak berbiji.

METODE PENELITIAN

Karakterisasi morfologi dilakukan pada bulan April 2009 sampai April 2010. Pengamatan karakter morfologi pohon, daun dan bunga dilakukan di sentra produksi pamelo di Kabupaten Sumedang, Kudus, Pati dan Magetan, sedangkan karakter buah diamati di Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Analisis isoenzim dilaksanakan pada bulan Maret 2011 di Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB.

Bahan yang digunakan untuk karakterisasi morfologi ialah bagian-bagian vegetatif dan reproduktif, dan untuk analisis isoenzim adalah daun muda 14 aksesi pamelo asal Sumedang (Cikoneng ST), Magetan (Jawa 1, Jawa 2, Jawa 3, Magetan, Sri Nyonya, Adas

Duku, Bali Putih, Nambangan, Bali Merah 1, Bali Merah 2), Kudus (Muria Merah 1, Muria Merah 2) dan Pati (Bageng Taji) yang tumbuh di kebun petani.

Identifikasi pamelo secara morfologi dilakukan berdasarkan *descriptor list* IPGRI (1999) yang telah dimodifikasi. Tanaman pamelo yang diamati telah dewasa, berumur lebih dari 6 tahun. Dari tiap lokasi dipilih tiga tanaman contoh. Pengamatan karakter kuantitatif dan kualitatif dievaluasi dari 10 daun, 10 bunga dan 10 buah dari setiap tanaman. Dalam penelitian ini aksesi pamelo dikelompokkan tidak berbiji, bila jumlah biji per buah kurang dari 10, dimasukkan kelompok potensial tidak berbiji, jika dalam satu aksesi terdapat buah berbiji dan tidak berbiji, dan kelompok buah berbiji jika jumlah biji per buah ≥ 10 .

Teknik analisis isoenzim esterase (EST), malat dehidrogenase (MDH), peroksidase (PER), dan asam fosfatase (ACP) mengikuti cara Horry (1989), sedangkan aspartat amino transferase (AAT) atau glutamat oksaloasetat transaminase (GOT) menggunakan metode Wendel dan Weeden (1989). Elektroforesis menggunakan gel pati kentang model horizontal, dengan konsentrasi 10%.

Analisis Data

Analisis kemiripan data morfologi dan isoenzim dilakukan melalui fungsi SIMQUAL (*Similarity for Qualitative Data*), sedangkan pengelompokan data matrik dan pembuatan dendrogram dilakukan dengan metode UPGMA (*Unweighted Pair-Group Method Arithmetic*), dan tingkat kepercayaan dendrogram ditentukan dengan fungsi MxComp menggunakan program NTSYSpc versi 2.02 (Rohlf 1998). Untuk mengurangi jumlah peubah yang akan dianalisis, digunakan analisis komponen utama, dengan mengekstrak nilai ragam dari *eigenvector* dari *eigenvalue* utama, dengan tingkat keragaman paling tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Morfologi Aksesi Pamelo Berbiji dan Tidak Berbiji

Hasil analisis komponen utama terhadap 14 aksesi pamelo, menunjukkan keragaman 70% dari 150 karakter baru diperoleh dari tujuh komponen utama (Tabel 1). Karakter yang paling berperan dalam pengelompokan pamelo terdapat pada daun dan buah (Tabel 2). Hasil pengelompokan berdasarkan jumlah biji, diperoleh delapan aksesi berbiji dua aksesi potensial tidak berbiji dan empat aksesi tidak berbiji (Tabel 2). Hasil ekstraksi komponen 1 vs 2 membentuk dua kelompok utama (Gambar 1), yaitu berbiji dan tidak berbiji (kecuali 'Bali Merah 2').

Hasil analisis SIMQUAL menunjukkan antar aksesi pamelo memiliki koefisien kemiripan 48.5-81.1%. Berdasarkan karakter morfologi ini, tingkat kemiripan tertinggi terdapat pada 'Bali Merah 1' dan 'Bali Merah 2', sehingga dalam dendrogram 'Bali Merah 2' terpisah dari aksesi tidak berbiji lainnya. Perbedaan morfologi utama antar kedua aksesi ini hanya tampak pada trikoma di permukaan bawah daun, posisi benang sari terhadap putik dan jumlah biji. Sementara aksesi Jawa 1, Muria Merah 1 dan Bageng Taji memiliki kesamaan pada perbandingan panjang benang sari terhadap putik (lebih pendek), bentuk buah (seperti pir), warna kulit buah masak (hijau-kuning), kelekatan antar juring (lemah), aksis (berongga), warna kantong jus (seragam), panjang kantong jus (sedang). Dengan

demikian secara morfologi, perbedaan antar kultivar jeruk berbiji dan tidak berbiji terutama terdapat pada karakter buah. Hal yang sama disampaikan Quang *et al.* (2011).

Tabel 1. Nilai ciri dan dua nilai komponen utama (KU) pertama berdasarkan penanda morfologi (pohon, daun, bunga dan buah)

No.	Nilai Ciri	Proporsi	Kumulatif	Karakter	KU1	Karakter	KU2
1	3,861	0,164	0,164	TBLEPI3	-0,210	INTI1	0,240
2	3,113	0,132	0,297	PINGHD1	0,195	KLTAJ7	0,206
3	2,791	0,119	0,415	PINGHD3	-0,195	LSD5	0,194
4	2,415	0,103	0,518	PV3	0,187	JB5	0,188
5	2,101	0,089	0,608	LSD3	0,173	KSRGWJ0	0,178
6	1,796	0,076	0,684	WKBH2	0,159	KSRGWJ1	-0,178
7	1,650	0,070	0,754	BTKBH2	0,154	JB1	0,173


Keterangan:

TBLEPI3: tebal epikarp tipis (1.10-1.29 mm)
 PINGHD1: pinggiran helai daun bergerigi
 PINGHD3: pinggiran helai daun rata
 PV3 : panjang vesicle (kantong jus) panjang
 LSD3 : lebar sayap daun sempit
 WKBH2: warna kulit buah masak hijau-kuning
 BTKBH2: bentuk buah ellipsoid
 INTI1 : inti padat
 JB5 : jumlah biji sedang (10.0-39.0)
 KLTAJ7 : kelekatan antar juring kuat
 KSRGWJ0: keseragaman warna kantong jus tidak seragam
 KSRGWJ1: keseragaman warna kantong jus seragam
 JB1 : jumlah biji sedikit (< 4.0)

Tabel 2. Pengelompokan kultivar pamelo berdasarkan jumlah biji dan karakter morfologi yang berperan dalam pengelompokan kultivar pamelo


Keiompok kultivar	Pinggiran daun	Lebar daun	sayap	Panjang kantong jus	Tebal epikarp	Warna kulit buah masak	Bentuk buah
Berbiji							
Cikoneng ST	bergerigi	sedang		panjang	sedang	hijau-kuning	ellipsoid
Jawa 2	rata	lebar		pendek	tipis	hijau-kuning	spheroid
Adas Duku	rata	sempit		pendek	tipis	kuning	spheroid
Magetan	rata	sempit		pendek	tipis	kuning tua	ellipsoid-spheroid
Sri Nyonya	rata	sedang		panjang	tebal	hijau-kuning	spheroid
Bali Putih	rata	sempit		pendek	tipis	hijau-kuning	spheroid
Muria Merah 2	bergerigi	sedang		pendek	sedang	hijau-kuning	spheroid
Jawa 3	rata	sedang		pendek	tebal	hijau-kuning	spheroid
Potensial tidak berbiji							
Nambangan	rata	sempit		sedang	tipis	kuning	spheroid
Bali Merah 1	rata	sempit		pendek	tipis	hijau	spheroid-pyriform
Tidak berbiji							
Bali Merah 2	rata	sempit		pendek	tipis	hijau	oblloid-spheroid
Jawa 1	rata	sempit		sedang	sedang	hijau-kuning	pyriform
Muria Merah 1	bergerigi	lebar		sedang	tebal	hijau-kuning	pyriform
Bageng	bergerigi	sedang		sedang	tebal	hijau-kuning	pyriform

Hasil pengelompokan dengan UPGMA menghasilkan dendrogram yang memisahkan aksesi atas dua kelompok pada tingkat kesamaan 63.4%. Kelompok I terdiri atas aksesi berbiji dan potensial tidak berbiji, kecuali 'Bali Merah 2', kelompok II seluruhnya berisi aksesi tidak berbiji. Pada koefisien kemiripan 0.674, kelompok I dibedakan atas tiga subkelompok: A ('Cikongeng ST' dan 'Sri Nyonya'), B ('Adas Duku', 'Muria Merah 2', 'Jawa 3', 'Nambangan', 'Magetan', 'Bali Putih', 'Bali Merah 1' dan 'Bali Merah 2'), dan C (Jawa 2). Kelompok II hanya terdiri atas satu subkelompok D (Jawa 1, Bageng Taji dan Muria Merah 2) (Gambar 2).



Gambar 1. Analisis komponen utama kemiripan 14 aksesi pamelo menggunakan penanda morfologi yang dipetakan ke dalam bentuk dua sumbu komponen utama yang pertama.

Keterangan: ● berbiji, ○ potensial tidak berbiji, □ tak berbiji




Gambar 2. Dendrogram 14 aksesi pamelo berdasarkan penanda morfologi.

Keterangan: ● berbiji, ○ potensial tidak berbiji, □ tidak berbiji

Karakter Isoenzim Aksesi Pamelo Berbiji dan Tidak Berbiji

Hasil analisis pada 14 aksesi menunjukkan empat sistem enzim bersifat polimorfik, dengan tingkat polimorfisme tertinggi pada EST, diikuti PER, MDH dan ACP, sedangkan AAT bersifat monomorfik. Hasil analisis komponen utama (AKU) terhadap 14 aksesi pamelo menunjukkan karakter yang paling berperan terhadap pengelompokan aksesi pamelo adalah MDH (R_f 0.11 dan 0.14), diikuti oleh ACP (R_f 0.24 dan 0.33), berturut-turut sebesar 0.418, 0.411, 0.352 dan 0.344 (Tabel 3). Keragaan dan zimogram hasil analisis isoenzym ditampilkan pada Gambar 3, dan hasil analisis komponen utama ini dipetakan pada Gambar 4, yang mengelompokkan aksesi pamelo atas berbiji dan tidak berbiji (kecuali Muria Merah 2). Masuknya 'Muria Merah 2' pada kelompok tidak berbiji, karena memiliki pita MDH 0.11, sehingga karakter yang benar-benar spesifik membedakan aksesi tidak berbiji adalah ACP 0.24. Hal ini membuat isoenzym ACP potensial digunakan untuk membedakan aksesi pamelo tidak berbiji.




Gambar 3 Pola pita isoenzim (a) MDH dan (b) ACP pada 14 aksesi pamelo.

Tabel 3. Nilai ciri dan dua nilai komponen utama (KU) pertama berdasarkan penanda isoenzim (EST, PER, MDH dan ACP)

O.	Nilai Ciri	Proporsi	Kumulatif	Karakter	KU1	Karakter	KU2
1	1,291	0,298	0,295	MDH011	0,418	EST019	0,387
2	0,683	0,156	0,451	MDH014	0,411	PER010	0,336
3	0,547	0,125	0,576	ACP024	0,352	MDH030	0,330
4	0,513	0,117	0,694	ACP033	0,344	ACP033	0,322


Berdasarkan analisis SIMQUAL, diketahui pengelompokan aksesi pamelo berdasarkan karakter isoenzim terbentuk pada tingkat kemiripan 22,2-94,7%. Dengan demikian keragaman antar aksesi pamelo cukup besar. Keheterogenan genotipe pada pamelo disebabkan oleh monoembrioni (Hirai dan Kajiura 1987). Sifat monoembriyonik ini menunjukkan embrio yang didapat bersifat zиготик и memiliki keragaman genetik lebih tinggi dibanding spesies jeruk poliembrioni. Selain itu keragaman genetik antar individu dalam populasi dan antar kultivar pada jeruk secara alami juga terjadi melalui mutasi dan seleksi (Hearn 1994), karena mutasi alami dan sport sering terjadi pada jeruk (Raza *et al.* 2003), disamping hibridisasi dan adaptasi terhadap lingkungan. Keragaman genetik yang besar antar aksesi pamelo merupakan bahan dasar potensial untuk meningkatkan kualitas melalui seleksi untuk mendapatkan kultivar unggul.



Keterangan: ●berbiji, ○potensial tidak berbiji, □tak berbiji

Gambar 4 Analisis komponen utama kemiripan 14 aksesi pamelo menggunakan penanda isoenzim yang dipetakan ke dalam bentuk dua sumbu komponen utama yang pertama.

Analisis dengan program NTSYSpc menunjukkan nilai korelasi matriks kesamaan MxComp sebesar $r = 0,9$, dengan demikian dendrogram yang dihasilkan dianggap cukup menggambarkan pengelompokan aksesi pamelo (Rohif 1998). Analisis pengelompokan menghasilkan dendrogram (Gambar 5) yang pada koefisien kemiripan 0.49 memisahkan berbagai aksesi pamelo menjadi dua kelompok. Kelompok I terdiri atas sembilan aksesi berbiji dan potensial tidak berbiji, dan kelompok II terdiri atas empat aksesi tidak berbiji dan satu aksesi berbiji.



Keterangan: ●berbiji, ○potensial tidak berbiji, □tak berbiji

Gambar 5. Dendrogram 14 aksesi pamelo berdasarkan penanda isoenzim.


Karakter Gabungan Penanda Morfologi dan Isoenzim

Hasil analisis komponen utama pada karakter gabungan morfologi dan isoenzim menunjukkan keragaman sebesar 70% baru diperoleh dari enam komponen utama. Enam karakter yang berperan terhadap pengelompokan aksesi pamelo adalah tebal epikarp, ACP (R_f 0,33), MDH (R_f 0,14), MDH (R_f 0,11), ACP (R_f 0,24) dan jumlah biji sedikit (kurang dari 10) (Tabel 4). Hasil pemetaan dengan analisis komponen utama, menghasilkan peta yang memisahkan aksesi berbiji dan tidak berbiji (Gambar 6). Komposisi ini hampir sama dengan yang dihasilkan oleh karakterisasi berdasarkan sifat morfologi, yaitu aksesi tidak berbiji kecuali 'Bali Merah 2' membentuk kelompok terpisah dari aksesi berbiji (Gambar 1).

Tabel 4 Nilai ciri dan dua nilai komponen utama (KU) pertama berdasarkan penanda morfologi dan isoenzim (EST, PER, MDH dan ACP)

No.	Nilai Ciri	Proporsi	Kumulatif	Karakter	KU1	Karakter	KU2
1	4,934	0,175	0,175	TBLEPI1	0,182	KLTAJ7	0,208
2	3,776	0,134	0,309	ACP033	0,170	LSD	0,196
3	3,264	0,116	0,425	MDH014	0,168	PER016	0,195
4	2,960	0,105	0,529	MDH011	0,168	JB5	0,187
5	2,718	0,096	0,626	ACP024	0,154	KLTAJ5	0,164
6	2,163	0,077	0,703	JB1	0,154	PB5	0,164


Keterangan: TBLEPI3 : tebal epikarp tipis (1.10-1.29 mm)
 KLTAJ5 : kelekatatan antar juring sedang
 KLTAJ7 : kelekatatan antar juring kuat
 JB1 : jumlah biji 0.0-9.0
 JB5 : jumlah biji 10.0-39.0
 PB5 : panjang biji sedang



Keterangan: ● berbiji, ○ potensial tidak berbiji, ▲ tidak berbiji

Gambar 6 Analisis komponen utama kemiripan 14 aksesi pamelo menggunakan penanda morfologi dan isoenzim yang dipetakan ke dalam bentuk dua sumbu komponen utama yang pertama.

Analisis pengelompokan dengan UPGMA menghasilkan dendrogram yang pada koefisien kemiripan 0,64 memisahkan aksesi pamelo menjadi dua kelompok. Pada koefisien kemiripan 0,65 kelompok I yang terdiri atas aksesi berbiji dan potensial tidak berbiji, sedangkan kelompok II hanya terdiri atas subkelompok C ('Jawa 1', 'Bageng Taji' dan 'Muria Merah 1') yang seluruhnya berupa aksesi tidak berbiji (Gambar 7).



Gambar 7 Dendrogram 14 aksesi pamelo berdasarkan penanda morfologi dan isoenzim.

KESIMPULAN

Perbedaan antara aksesi pamelo berbiji dan tidak berbiji hanya dapat dilihat pada buahnya (bentuk buah, aksis buah dan jumlah biji per buah). Secara morfologi aksesi pamelo yang diamati dapat dikelompokkan menjadi aksesi berbiji (Cikoneng ST, Jawa 2, Magetan, Sri Nyonya, Adas Duku, Bali Putih, Muria Merah 2, Jawa 3), potensial tidak berbiji (Nambangan dan Bali Merah 1) dan tidak berbiji (Bali Merah 2, Jawa 1, Bageng Taji dan Muria Merah 1). Pada umumnya aksesi tidak berbiji memiliki bentuk buah *pyriform* dan aksis berongga dan memiliki pita pada ACP Rf 0,24. Dendrogram berdasarkan karakter morfologi dan isoenzim dapat membedakan antara aksesi berbiji, potensial tidak berbiji dan tidak berbiji.

DAFTAR PUSTAKA

- Altaf N, Khan AR. 2007. The seedless trait in kinnow fruit. Pak J Bot 39: 2003-2008.
 Ara N, Bashar MK, Kalim Udin MD, Khalequzzaman KM. 2008. Evaluation of pummelo, *Citrus grandis* L. cultivars in northern area of Bangladesh. J Agric Res 46: 65-75.
 Bakhtiar. 2002. Analisis keragaman genetik gladiol dengan penanda RAPD dan evaluasi ketahanan turunan dari beberapa kombinasi silangan terhadap Fusarium. [thesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

- Campos ET, Espinosa MAG, Warburton ML, Varela AS, Monter AV. 2005. Characterization of mandarin (*Citrus spp*) using morphological and AFLP markers. *Interscience* 11:687-692.
- Hearn CJ. 1994. The evolution of citrus species - methods to develop new sweet orange cultivars. *Proc Fla State Hort Soc* 107: 1-3.
- Hirai M, Kajiwara I. 1987. Genetic analysis of leaf isozymes in citrus. *Jpn J Breed* 37:377-388.
- Hardiyanto, Mujiarto E, Sulasmri ES. 2007. Kekerabatan genetik beberapa spesies jeruk berdasarkan taksonometri. *J Hort* 17: 203-206.
- Hodgson RW. 1967. Horticultural Varieties of Citrus. Di dalam: Reuther W, Webber HJ and Batchelor ID, editor. *The Citrus Industry*. Volume ke-1. Berkeley, USA: Univ. of Calif. Press, hlm 534-537. <http://lib.ucr.edu/agnic/webber/Vol1/Chapter4.html>. [10 April 2009].
- Horry JP. 1989. The Genetic Structure of Wild and Cultivated Bananas as Perceived Through Isozymes Variation. Di dalam: JP Horry, editor *Chemotaxonomie et Organization Genetic dans Le Genre Musa*. Paris: Universite De-Paris-SUD, Centre D'Orsay.
- [IPGRI] International Plant Genetic Research Institute. 1999. *Descriptors for Citrus*. Rome, Italy: International Plant Genetic Resources Institute.
- King BJ, Lee LS, Scott PT. 1996. Identification of triploid citrus by isozyme analysis. *Euphytica* 90:223-231. Abstr.
- Koehler-Santos P, Dornellos ALC, de Freitos LB. 2003. Characterization of mandarin citrus germplasm from Southern Brazil by morphological and molecular analysis. *Pesq Agropec Bras* 7:797-806.
- Ladaniya, MS. 2008. *Citrus Fruit. Biology, Technology and Evaluation*. San Diego: Academic Press.
- Niyomdharm C. 1992. *Citrus maxima* (Burm.) Merr. Di dalam: Verheij EWM and Coronel E, editor. *Edible Fruits and Nuts. Plant Resources of South-East Asia*. 2. Bogor : Prosea Foundation. hlm 128-131.
- Perry MC, Battencourt E. 1997. Sources of information on existing germplasm collections. Di dalam: Guarino L, Ramanatha Rao V and Reid R, editor. *Collecting Plant Genetic Diversity*. Wallingford: CAB International.
- Phan TT, Nguyen PD, Nguyen TM. 2006. Identification of pummelo (*Citrus grandis* (L.) Osbeck) cultivars using isozyme electrophoresis. *Meded Rijksuniv Gent Fak Landbouwkde Toegep Biol Wet* 67:13-9.
- Rahman MM, Nito N, Isshiki S. 2001. Cultivar identification of 'Yuzu' (*Citrus junos* Sieb. Ex Tanaka) and related acid citrus by leaf isozymes. *Sci Hort* 87:191-198.
- Raza H, Khan MM, Khan AA. 2003. Review. Seedlessness in citrus. *Int J Agric Biol* 5:388-391.
- Rohlf F J. 1998. *NTSYSpc: Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System Version 2.02*. New York: Exeter Publications.
- Sykes SR. 2011. Characterisation of citrus rootstock germplasm introduced as seeds to Australia from the People's Republic of China. *Sci Hort* 127: 298-304.
- Wendel JF, Weeden NF. 1989. Visualization and Interpretation of Plant Isozymes. Di dalam: Soltis DE and Soltis PS, editor. *Isozymes in Plant Biology*. Oregon, USA: Dioscorides Press. Hlm' 5-45.
- Weeden NF, Wendel JF. 1989. Genetics of Plant Isozymes. Di dalam: Soltis DE and Soltis PS, editor. *Isozymes in Plant Biology*. Oregon, USA: Dioscorides Press. Hlm 46-72.