

KUALITAS SENSORIS DAGING ITIK AFKIR YANG DIBERI TEPUNG DAUN ASAM GELUGUR (*GARCINIA ANTROVIRIDIS*) DALAM RANSUM NONKONVENTSIONAL TERFERMENTASI

By Dewi Wahyuni

1

KUALITAS SENSORIS DAGING ITIK AFKIR YANG DIBERI TEPUNG DAUN ASAM GELUGUR (GARCINIA ANTROVIRIDIS) DALAM RANSUM NONKONVENTIONAL TERFERMENTASI

SENSORY QUALITY OF MEAT OF CULLED DUCKS FED FERMENTED NONCONVENTIONAL RATIONS WITH GARCINIA (GARCINIA ANTROVIRIDIS) LEAF MEAL INCLUSION

Merliana¹, E Dihansih^{1a}, dan D Wahyuni¹

10

¹Program studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Djunda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

^aKorespondensi: Elis Dihansih, E-mail: elis.dihansih@unida.ac.id

(Received: 08-07-2020; Accepted: 11-10-2020)

ABSTRACT

Duck meat is a nutritious food but it gains less interest from the people. This may be attributed to the fishy smell duck meat has. Garcinia contains organic acids including tartaric, citric, malic, and hydroxycitric acids. The main organic acid contained in garcinia is hydroxycitric acid (HCA) which has antilipidemic and antiobesity properties. This study was conducted at the poultry farm of Department of Animal Science, Djunda University, Bogor for 40 days from May to June 2019. A completely randomized design with 4 treatment and 5 replicates was used. Treatments consisted of the inclusion of garcinia leaf meal in rations by 0% (R0), 2% (R1), 4% (R2), and 6% (R3). Data were subjected to a Kruskal Wallis test. Measurements were taken on hedonic and quality hedonic parameters including aroma, tenderness, color, taste, and juiciness. Results of the hedonic test showed that the inclusion of garcinia leaf meal in rations significantly ($P<0.05$) affected meat color. Significant differences ($P<0.05$) in meat color and taste were found based on the results of the quality hedonic test. The inclusion of garcinia leaf meal 6% in fermented nonconventional rations was found to increase panelist likeness in meat color and improve meat color brightness. No difference in aroma, tenderness, taste and juiciness in meat was found in all treatments.

Key words: culled duck, garcinia, organoleptic, fermented nonconventional ration, hydroxycitric acid

ABSTRAK

Daging itik merupakan salah satu bahan pangan yang masih kurang diminati oleh masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging itik adalah karena adanya aroma bau amis. Asam gelugur (*Garcinia antroviridis*) mengandung asam-asam organik seperti asam tartarik, asam sitrat, asam malat dan asam hidroksisitrat. Asam hidroksisitrat (HCA) merupakan asam organik utama yang berkhasiat sebagai antilipidemik dan antiobesitas. Penelitian dilakukan selama 40 hari yaitu bulan Mei - Juni 2019 bertempat di kandang unggas Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Djunda Bogor. Ransum yang digunakan adalah ransum nonkonvensional terfermentasi. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 5 ulangan. Setiap perlakuan terdiri dari R0 = 0% tepung daun asam gelugur, R1 = 2% tepung daun asam gelugur, R2 = 4% tepung daun asam gelugur, R3 = 6% tepung daun asam gelugur. Data dianalisis menggunakan Kruskal Wallis. Peubah yang diamati yaitu uji hedonik dan uji mutu hedonik (aroma, keempukan, warna, rasa dan juiceness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung daun asam gelugur berbeda nyata ($P<0,05$) terhadap warna daging itik pada uji hedonik pada uji mutu hedonik berbeda nyata ($P<0,05$) terhadap warna dan rasa daging itik. Pemberian tepung daun asam gelugur (*Garcinia antroviridis*) sebesar 6% dalam ransum nonkonvensional terfermentasi meningkatkan kesukaan panelis terhadap warna daging dan meningkatkan kecerahan warna daging akan tetapi tidak merubah rasa, aroma, keempukan dan juiceness daging itik

Kata Kunci: *Itik afkir, asam gelugur, organoleptik, ransum nonkonvensional terfermentasi, asam hidroksisitrat*

1

Merliana, E Dihansih, D Wahyuni. 2020. Kualitas Sensoris Daging Itik Afkir Yang Diberi Tepung Daun Asam Gelugur (*Garcinia Atroviridis*) Dalam Ransum Nonkonvensional Terfermentasi. *Jurnal Peternakan Nusantara* 6(2): 47-56

PENDAHULUAN

Permintaan terhadap produk hasil ternak berupa daging terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Akan tetapi sumber daya yang tersedia belum dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Salah satu ternak unggas yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah ternak itik yaitu sebagai protein hewani penghasil daging dan telur yang dapat digunakan untuk memenuhi gizi masyarakat Indonesia. Menurut data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018) produksi daging itik meningkat pada tahun 2017 sebanyak 36.392 ton dan pada tahun 2018 sebanyak 38.004 ton.

Sumber protein hewani dari daging itik merupakan salah satu bahan pangan yang masih kurang diminati oleh masyarakat, banyak yang mengagap bahwa daging itik berkualitas rendah, lain halnya dengan daging sapi, daging kambing maupun daging ayam. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging itik adalah karena adanya aroma yang tidak sedap yaitu bau amis. Penyebab aroma bau amis yang terdapat dalam daging itik adalah karena adanya komponen volatile yang berasal dari hasil oksidasi lemak. Reaksi ini disebabkan oleh asam lemak tidak jenuh. Dalam daging itik kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi daripada daging ayam (Hustiani 2001).

Kualitas sensoris daging merupakan karakteristik daging yang dinilai dan dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. Faktor yang menentukan kualitas daging meliputi warna, keempukan, aroma, rasa serta *juiceness*. kualitas sensoris pada daging dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik yang mempengaruhi kualitas daging antara lain spesies, umur, bangsa genetik, tipe, jenis dan pakan ternak. Faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap kualitas daging antara lain meliputi metode pemasakan pH karkas dan daging, stimulasi listrik, pelayuan, bahan tambahan seperti enzim pengempuk daging,

hormon, metode penyimpanan dan perservasi, antibiotik, marbling atau lemak intramuskuler macam otot daging dan lokasi pada suatu otot daging (Soeparno 2011)

Asam gelugur (*Garcinia atroviridis*) merupakan salah satu jenis tanaman dari genus *Garcinia*, jenis *Garcinia atroviridis* biasanya ditemukan di hutan tropis di bagian selatan dari Thailand dan Malaysia. Di Indonsia asam gelugur dapat ditemukan di wilayah bagian Sumatera Utara. Asam gelugur (*Garcinia atroviridis*) memiliki kandungan zat aktif berupa tanin, alkaloid, fenolik, saponin, protein dan karbohidrat selain itu asam gelugur juga mengandung asam-asam organik antara lain asam sitrat, asam tartarik dan asam malat. Asam hidroksisitrat (HCA) adalah asam organik utama yang berperan untuk antibesitas seta antilipidemik. HCA dalam buah *garcinia* terdapat sekitar 10-30% (Meera et al 2013). Asam gelugur juga bersifat sebagai antioksidan dan mampu menurunkan berat badan (Chung 2006).

Berdasarkan asumsi diatas kendala yang dihadapi dalam pengembangan daging itik, yaitu bau amis karena kadar lemak yang tinggi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian penggunaan tepung daun asam gelugur (*Garcinia atroviridis*) yang ditambahkan dalam pakan non konvensional terfermentasi sebagai penyusun ransum itik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kualitas sensoris daging itik yang diberi tepung daun asam gelugur (*Garcinia atroviridis*) dalam ransum non konvensional terfermentasi

MATERI DAN METODE

Materi

Penelitian dilaksanakan selama 40 hari mulai pada bulan Mei-Juni 2019, bertempat di kandang unggas Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian dan uji sensoris dilakukan di Laboratorium Universitas Djuanda Bogor, Jln. Tol Ciawi No. 1 Bogor, Ternak yang digunakan

dalam penelitian ini adalah itik lokal afkir yang didapatkan dari Cirebon sebanyak 40 ekor berjenis kelamin betina⁷ dan diberi perlakuan selama 40 hari. Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini sebagai ransum dasar yaitu jagung kuning, dedak halus, bungkil kedelai, tepung ikan, premix, DCP dan CaCO₃. Pakan nonkonvensional yang digunakan yaitu bungkil kelapa dan bungkil inti sawit. Pakan tersebut difermentasi dengan menggunakan kapang *Aspergillus niger*. Pakan yang sudah difermentasi digunakan sebagai substansi pakan dasar itik tegal dengan tambahan tepung daun asam gelugur. Berikut adalah susunan bahan pakan yang digunakan sebagai ransum itik lokal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Susunan Bahan Pyang Digunakan Sebagai Ransum Itik Lokal.

No	Bahan pakan	Jumlah (%)
1	Jagung kuning	40
2	Dedak halus	19
3	Bungkil kedelai	4,5
4	Tepung ikan	4
5	Premix	0,5
6	DCP	1
7	CaCO ₃	1
8	Bungkil kelapa	15
9	Bungkil inti sawit	15
Total		100

Tabel 2 Kandungan Nutrisi Ransum Setiap Perlakuan

Perlakuan	R1	R2	R3	R4
Air (%)	11,61	10,74	10,23	9,21
Abu (%)	8,43	8,43	7,54	7,80
Lemak (%)	13,32	2,57	3,74	3,34
Protein (%)	4,25	13,32	13,18	12,00
Serat Kasar (%)	4,25	4,25	8,97	9,30
BETN (%)	59,82	59,82	56,34	58,35
Gross Energi(Kal/gr)	3814	4099	3918	4022

⁷ Kandang yang digunakan pada penelitian ini adalah kandang battery yang berjumlah 40 unit dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm dan tinggi 35 cm yang terbuat dari kawat besi. Alat

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat pakan, tempat minum, kantong plastik, timbangan digital, kompor gas, oven, blender, panci besar, saringan nasi, ember.

Perlakuan

Perlakuan yang diberikan yaitu :

R0 = 0% Tepung daun asam gelugur (kontrol)

R1 = Penambahan 2% tepung daun asam gelugur dalam ransum

R2 = Penambahan 4% tepung daun asam gelugur dalam ransum

R3 = Penambahan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum

Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Berikut adalah model matematika yang digunakan dalam penelitian (Hanafiah 2003):

$$\text{Y}_{ij} = \mu + T_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i pada ulangan ke-j (1,2,3).

μ = Nilai tengah umum.

T_i = Pengaruh frekuensi pemberian tepung daun asam gelugur.

ϵ_{ij} = Galat pada perlakuan ke-I dan ulangan ke j

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah uji sensoris yang dibagi menjadi 2 yaitu, uji hedonik dan uji mutu hedonik. Parameter yang diuji meliputi, aroma, keempukan, warna, rasa dan *juiceness*. Pada pengujian sampel diletakan didalam cup plastik yang diberi kode tiga digit angka pada setiap perlakuan. Kemudian panelis diminta memberikan penilaian tingkat kesukaannya dengan kisaran 4 - 5 (1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= netral, 4= suka, 5= sangat suka) untuk uji hedonik. Pengujian uji mutu hedonik dengan 5 kategori peubah dan skor penilaian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Skor Penilaian Uji Mutu Hedonik

Peubah	Skor	Kriteria
Aroma	1	Sangat Beraroma
	2	Amis
	3	Beraroma Amis
	4	Cukup Beraroma
	5	Amis
	6	Sedikit Beraroma
Keempukan	1	Tidak Beraroma
	2	Amis
	3	Sangat Empuk
	4	Empuk
	5	Cukup Empuk
	6	Sedikit Empuk
Warna	1	Tidak Empuk
	2	Sangat Cerah
	3	Cerah
	4	Cukup Cerah
	5	Gelap
	6	Sangat Gelap
Rasa	1	Sangat Enak
	2	Enak
	3	Agak Enak
	4	Tidak Enak
	5	Sangat Tidak Enak
	6	Enak
Juiceness	1	Sangat Juiceness
	2	Juiceness
	3	Cukup Juiceness
	4	Sedikit Juiceness
	5	Tidak Juiceness
	6	Sangat Tidak Juiceness

Sumber: Hafid et al (2000) yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti.

Prosedur Pelaksanaan

Kandang yang digunakan dalam penelitian dibersihkan dan diberi sumber penerangan. Peralatan untuk penelitian disiapkan seperti gelas ukur, tempat minum, timbangan, tempat pakan, ember dll.

Persiapan Itik

Itik yang digunakan dalam penelitian adalah itik afkir sebanyak 40 ekor dengan keadaaan sehat, dan tidak cacat. Bobot badan awal itik ditimbang dan dicatat serta diberikan kode identitas perlakuan pada setiap kandang, penempatan kandang dan perlakuan dilakukan secara acak.

Pembuatan Pakan Fermentasi


Bahan pakan yang difermentasi menggunakan kapang *Aspergillus niger* terdiri dari bungkil inti sawit dan bungkil kelapa. Bahan penyusun ransum terdiri dari jagung kuning, dedak halus, bungkil kedelai, tepung ikan, tepung ikan, premix, DCP, CaCO₃. Berikut proses fermentasi pakan menurut Supriyati et al (1998).

Tabel 4 Proses Fermentasi Pakan

No	Keterangan
1	Bungkin kelapa / inti sawit disiapkan + ditambahkan air (1 kg pakan : 600 ml air)
2	Bungkin kelapa / inti sawit kemudian diaduk dan dikukus selama 30 menit
3	Bungkin kelapa / inti sawit yang sudah dikukus didinginkan sebelum dicampur dengan bahan fermentasi yaitu <i>Aspergillus niger</i>
4	Bungkin kelapa / inti sawit dicampurkan inokulan fermentasi, inokulan yang digunakan antara lain (Urea 3,5g, CaCl 0,25g, KCL 0,75g, MgSO ₄ 2g, NaPO ₄ 12,5 g), <i>Aspergillus niger</i>
5	Bungkin kelapa / inti sawit dan inokulan dicampur rata dibungkus dan siap untuk difermentasi secara anaerob selama 3 hari. Bahan pakan yang telah selesai difermentasi dikeringkan selama 3-4 hari dengan menggunakan sinar matahari.
6	Tahap akhir pencampuran (Jagung kuning, dedak halus, bungkil kedelai, tepung ikan, premix, DCP, CaCO ₃) dengan bahan pakan yang sudah difermentasi

Proses Pembuatan Tepung Daun Asam gelugur

Daun asam yang digunakan adalah daun asam gelugur (*Garcinia antroviridis*). Berikut adalah proses pembuatan pembuatan daun asam.



Gambar 1 Proses pembuatan tepung daun asam

Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pukul 08.00 dan pukul 16.00 WIB. Pemberian tepung daun asam gelugur pada ternak diberikan pada saat pemberian pakan dengan mencampurkan kedalam pakan nonkonvensional terfermentasi. Rangkaian kegiatan lain adalah pembersihan kandang, pengisian air minum dan pengambilan feses.

Pemotongan itik dilakukan setelah perlakuan pada itik selesai atau 40 hari. Metode pemotongan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan memutuskan arteri karotis, esophagus dan vena jugularis yang berada antara kepala dan leher. Kemudian itik yang sudah dipotong digantung agar darah bisa mengalir, selanjutnya itik dimasukkan ke dalam air yang telah dipanaskan untuk memudahkan pencabutan bulu, setelah itu dilakukan pengkarkasan untuk mendapatkan karkas yang diambil untuk pengambilan data adalah bagian paha.

Pengambilan sampel untuk uji organoleptik menggunakan daging dan kulit paha itik. Masing-masing sampel sesuai perlakuan direbus dengan waktu 5 menit menggunakan presto. Daging dipotong dengan bentuk dadu kecil, disajikan didalam cup plastik yang diberi kode dengan angka sebanyak 3 digit pada setiap cup sampel.

Panelis untuk uji hedonik dan uji mutu hedonik adalah panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. Sebelum pengujian dimulai panelis diberi pengarahan terlebih dahulu oleh peneliti mengenai cara pengisian uji hedonik maupun uji mutu hedonik. Panelis akan menilai sampel daging yang diletakkan pada cup plastik dengan kode yang telah ditentukan peneliti. Pengujian sensoris ini dilaksanakan di Laboratorium Universitas Djuanda Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hedonik

Uji Organoleptik atau biasa juga disebut dengan uji sensoris merupakan suatu cara untuk mengukur, menguji atau mengamati aroma, keempukkan, warna, rasa dan *juiceness*. dari suatu produk dengan menggunakan kepekaan alat indra manusia. Penilaian dalam uji sensoris meliputi uji hedonik dan uji mutu hedonik. Uji hedonik merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengemukakan tanggapan kesukaan atau ketidaksuakaan panelis terhadap sampel dengan skala 1-5 (1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= netral, 4=suka, 5= sangat suka). Uji Kruskal Wallis digunakan dalam pengolahan data untuk mengetahui tingkat penerimaan maupun penolakan terhadap sampel. Nilai rataan dalam uji hedonik daging itik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 rataan Uji hedonic

Peubah	Perlakuan			
	R0	R1	R2	R3
Aroma	3,23±0,94	3,4±0,77	3,33±0,72	3±0,00
Keempukkan	3,28±0,80	3,23±0,93	2,97±0,85	3,33±1,03
	3,13±0,70			
Warna	^a	3,23±0,77 ^a	3,33±0,88 ^{ab}	3,63±0,67 ^b
Rasa	3,18±0,85	3,13±0,93	3,2±0,96	3,4±0,91
Juiceness	3,17±0,78 ⁵	3,2±0,80	3,2±0,81	3,3±0,97

Keterangan: Hurup superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($P<0,05$). R0: Pakan non konvensional terfermentasi + 0% Tepung daun asam gelugur, R1: Pakan non konvensional terfermentasi + 2% Tepung daun asam gelugur. R2: Pakan non konvensional terfermentasi + 4% Tepung daun asam gelugur, R3: Pakan non konvensional terfermentasi + 6% Tepung daun asam gelugur.

Berdasarkan hasil analisis *Kruskal Wallis* dari setiap perlakuan menunjukkan bahwa pemberian tepung daun asam gelugur pada pakan non konvensional terfermentasi berpengaruh $P<0,05$ terhadap warna tetapi tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap aroma, keempukkan, rasa dan *juiceness* daging itik.

Penilaian panelis pada uji hedonik terhadap seluruh peubah pada daging itik dapat diketahui pada tabel 5 yang diuji meliputi, aroma, keempukkan, warna, rasa dan *juiceness*. Hasil analisis terhadap warna daging itik dapat diketahui pada tabel 5 yang memberikan hasil bahwa peubah pada warna berbeda nyata ($P>0,05$), nilai rataan paling tinggi berada pada perlakuan R3 yaitu dengan penambahan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum dengan nilai rataan 3,63, menunjukkan bahwa

panelis lebih suka warna daging itik pada perlakuan ini (R3), dibandingkan dengan perlakuan R0 (0% tepung daun asam gelugur), R1 (2% tepung daun asam gelugur) dan R2 (4% tepung daun asam gelugur) yang menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap sampel daging itik netral dengan kisaran nilai rataan 3. Hal ini dibuktikan pada diagram uji hedonik gambar 3 warna pada perlakuan R3 memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya yang berarti semakin tinggi semakin disukai panelis. Tetapi nilai rataan pada tabel 5 menunjukkan semakin meningkatnya tepung daun asam gelugur yang ditambahkan dalam ransum, meningkat pula nilai rataan kesukaan panelis terhadap daging itik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan tepung daun asam gelugur dalam ransum non konvensional terfermentasi maka akan meningkatkan kesukaan panelis terhadap warna daging itik. Hasil penelitian Dihansih *et al* (2017) yang menggunakan pakan dengan tambahan larutan daun sirih dengan level 2,5 % yang menunjukkan hasil uji sensoris berbeda nyata ($P<0,05$) terhadap warna daging itik dengan nilai rataan sebesar 1,76 yang menunjukkan bahwa panelis lebih suka – sangat suka pada daging itik. Faktor utama yang dapat mempengaruhi penentu warna utama daging adalah konsentrasi pigmen daging (mioglobin) (Soeparno 2005).

Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis bahwa pemberian tepung daun asam gelugur pada setiap perlakuan pada peubah aroma daging itik menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Rataan penilaian panelis terhadap uji hedonik dari seluruh perlakuan pada aroma daging itik dengan nilai rataan sebesar 3,24 yang berarti bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap aroma daging itik berada pada kisaran netral. Hasil penelitian Fernando (2007) yaitu pemberian tepung daun sambiloto dalam pakan, skor uji organoleptik pada daging berkisar dari 2,72 – 3,08 dan berkisar pada daerah netral yang berarti panelis menerima aroma sampel.


Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis bahwa pemberian tepung daun asam gelugur ⁶ida tingkat keempukan daging itik menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata ($P<0,05$). Penilaian kesukaan panelis

terhadap uji hedonik pada peubah keempukan daging itik dari seluruh nilai rataan perlakuan yaitu sebesar 3,20 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap daging itik berada pada kisaran netral. Berbeda dengan hasil penelitian Dihansih *et al* (2017) yang menggunakan pakan dengan tambahan larutan daun sirih, penilaian kesukaan panelis terhadap keempukan berada pada nilai rataan sebesar 2,47 untuk seluruh perlakuan, yang berarti tingkat kesukaan panelis berada pada daerah suka. Keempukan pada daging sangat mempengaruhi daya terima konsumen Mattaputty dan Suryana (2010).

Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis bahwa pemberian tepung daun asam gelugur dari seluruh perlakuan pada peubah rasa daging itik menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Penilaian panelis terhadap uji hedonik pada rasa daging itik dengan nilai seluruh rataan 3,24 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap rasa daging itik netral. Berbeda dengan hasil penelitian Dihansih *et al* (2017) kualitas daging itik yang diberikan penambahan larutan daun sirih sebanyak 2,5% yang berpengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap daging itik dengan rataan 2,06 panelis menilai suka terhadap sampel daging itik. Penelitian Siti *et al* (2016) kualitas daging uggas yang diberikan tambahan ekstrak daun papaya terfermentasi tidak berpengaruh nyata ($P<0,05$) terhadap rasa dengan nilai rataan 3,28 yang menunjukkan panelis menilai tidak suka.

Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis bahwa pemberian tepung daun asam gelugur pada peubah *juiceness* daging itik menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Penilaian panelis terhadap uji hedonik pada *juiceness* daging itik dengan nilai rataan 3,22 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap *juiceness* daging itik netral. Soeparno (2005) mengatakan bahwa *juiceness* dalam daging yang dimasak mempunyai 2 komponen organoleptik yaitu, impresi kebasahan selama awal pengunyahan oleh pembasahan cairan daging secara cepat. Daging yang berkualitas baik akan terasa lebih *juicy*. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingginya kadar lemak

intramuscular pada daging yang berkualitas baik.



Gambar 2 Diagram Hasil Uji Hedonik

Uji Mutu Hedonik

Uji mutu hedonik meliputi aroma, keempukkan, warna, rasa dan *juiceness* dengan kisaran penilaian 1 – 5 yang lebih spesifik. Penilaian mutu hedonik diberikan panelis sesuai dengan alat indera manusia meliputi mata (penglihatan), hidung (penciuman), dan lidah (pengecap rasa). Hasil rataan uji mutu hedonik pada setiap perlakuan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 1 Rataan Nilai Uji Mutu Hedonik Daging Itik

Peubah	Perlakuan			
	R0	R1	R2	R3
Aroma	2,70±1,2 4	2,33±1,1 2	2,80±1,03 9	2,83±1,0
Keempuk an	2,60±1,0 0	2,77±1,0 7	2,73±1,23 2	2,80±1,3
Warna	2,00±1,2 3 ^a	1,87±1,2 5 ^a	1,70±1,24 ^a	2,73±1,6 0 ^b
Rasa	3,30±0,8 4 ^b	2,77±0,9 0 ^a	2,97±0,96 ^{ab}	3,43±0,9 4 ^b
Juicen ess	2,70±1,0 2	2,97±1,0 0 ⁵	2,67±0,92 7	2,77±1,1

Keterangan: Huruf superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($P<0,05$). R0: Pakan non konvensional terfermentasi + 0% Tepung daun asam gelugur, R1: Pakan non konvensional terfermentasi + 2% Tepung daun asam gelugur. R2: Pakan non konvensional terfermentasi + 4% Tepung daun asam gelugur, R3: Pakan non konvensional terfermentasi + 6% Tepung daun asam gelugur.

Penilaian panelis terhadap aroma daging itik pada uji mutu hedonik menghasilkan nilai rataan seluruh perlakuan sebesar 2,67 yang berarti menunjukkan bahwa tingkat penilaian panelis terhadap aroma daging itik yang diberi tepung daun asam gelugur berada pada kisaran cukup beraroma amis. Berdasarkan analisis Kruskal Wallis pemberian tepung daun asam gelugur pada seluruh perlakuan terhadap aroma daging itik menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Hasil penelitian Djawang *et al* (2019) yang melakukan penelitian penambahan nanokapsul jus kunyit yang ditambahkan pada pakan itik melaporkan bahwa pada aroma daging itik tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Nilai rataan panelis terhadap aroma daging itik sebesar 3,2 artinya berada dalam kisaran agak sedikit amis. Berbeda dengan hasil penelitian Febriana (2006) daging itik dengan penambahan tepung daun beluntas sebanyak 2% memiliki tingkat bau amis terendah yang menunjukkan berbeda nyata dari perlakuan lainnya. Aroma atau bau daging dihasilkan dari substansi-substansi volatile yang ditangkap oleh reseptor penciuman yang ada dibelakang hidung yang selanjutnya diinterpretasikan oleh otak (Warris 2000). Menurut Soeparno (2005) aroma daging olahan juga dapat dipengaruhi oleh umur ternak, tipe pakan, jenis kelamin, lemak, bangsa, kondisi pemotongan daging setelah pemotongan, lama penyimpanan daging serta lama, jenis dan temperatur pemasakan.

Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum terhadap keempukkan daging itik memberikan hasil yang tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa pada setiap perlakuan penilaian panelis terhadap keempukkan daging itik menghasilkan nilai rataan 2,73 yang menunjukkan bahwa keempukkan daging berada dalam kisaran cukup empuk. Berbeda dengan hasil penelitian Djawang *et al* (2019) yang menambahkan nanokapsul jus kunyit pada pakan menghasilkan rataan nilai dari panelis dengan rataan 2,16 yaitu dengan kisaran daging empuk.

Menurut Suradi (2006) kapasitas mengikat air merupakan faktor mutu yang penting karena berpengaruh langsung terhadap keadaan


fisik daging seperti keempukan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi keempukan pada daging adalah komposisi daging itu sendiri yaitu berupa tenunan pengikat, serabut daging, sel-sel lemak yang ada diantara serabut daging (Reny 2009).

Berdasarkan hasil analisis Kruskal Wallis pada warna daging itik memberikan hasil yang berbeda nyata ($P<0,05$). Pada tabel 6 penilaian panelis terhadap R0, R1 dan R2 menunjukkan nilai rataan paling rendah yaitu 1,70 – 2,00 yang berarti berada dalam kisaran gelap sedangkan penilaian panelis terhadap R3 memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 2,73 yang berarti warna daging itik berada dalam kisaran cukup cerah. Hal ini diakibatkan oleh penurunan pH daging yang disebabkan oleh asam yang terkandung dalam asam gelugur yaitu asam sitrat. Konsentrasi asam sitrat yang lebih besar dan lebih banyak mengandung senyawa asam yang mampu menghambat terbentuknya pewarnaan pada daging. Hasil penelitian Dihansih *et al* (2017) yang memberikan larutan daun sirih pada pakan penilaian dari panelis terhadap warna pada uji mutu hedonik memiliki rataan pada seluruh perlakuan 2,00 yang menunjukkan bahwa warna pada sampel daging adalah m_{121} cerah. Menurut Soeparno (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi warna daging adalah pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress, tingkat aktivitas, tipe otot, pH dan oksigen. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi konsentrasi pigmen daging myoglobin, tipe molekul myoglobin, status kimia myoglobin dan kondisi kimia serta fisik komponen lain dalam daging mempunyai peranan besar dalam menentukan warna daging. Zulfahmi (2013) menyatakan bahwa warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh indra mata terhadap cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut.

Berdasarkan analisis uji Kruskal Wallis nilai pada rasa daging itik memberikan hasil yang berbeda nyata ($P<0,05$). Dapat diketahui pada tabel 6 bahwa penilaian panelis terhadap rasa daging itik pada uji mutu hedonik dari setiap perlakuan menunjukkan bahwa pada setiap perlakuan tidak merubah rasa daging itik, nilai rataan penilaian panelis dari seluruh perlakuan sebesar 3,12 yang menunjukkan bahwa penilaian panelis terhadap rasa daging itik

dalam kisaran agak enak. Hasil penelitian Dihansih *et al* (2017) bahwa penambahan larutan daun sirih 7,5 % dalam pakan itik menunjukkan bahwa panelis menilai enak pada rasa daging itik.

Rataan dari seluruh perlakuan pada peubah juiceness uji mutu hedonik daging itik pada tabel 6 yaitu sebesar 2,78 hal ini menunjukkan daging itik berada dalam kisaran cukup juiceness. Juiceness pada daging yang telah dimasak mempunyai komponen kandungan air selama awal pengunyahan yang disebabkan stimulan lemak terhadap salivasi (Soeparno 2005). Juiceness pada daging dipengaruhi oleh adanya lemak intramuscular marbling sebagai stimulan terhadap salivasi dengan adanya kesan cairan yang dilepaskan selama pengunyahan dan salivasi yang diproduksi (Khaerina *et al* 2017).



Gambar 1 Diagram Hasil Uji Mutu Hedonik

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Pemberian tepung daun asam gelugur (*Garcinia antroviridis*) sebesar 6% dalam ransum nonkonvensional fermentasi meningkatkan kesukaan panelis terhadap warna daging dan meningkatkan kecerahan warna daging akan tetapi tidak merubah rasa, aroma, keempukan dan juiceness daging itik.

Implikasi

Penelitian lebih lanjut sebaiknya menambahkan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum nonkonvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- [Ditjen PKH] Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018. Direktorat Jendral Peternakan. Departemen Pertanian RI.
- Chung CS. 2006. Sweet and Sour, the Lovely Gelugor. *Gardenwise* Vol. 2(6): 18-19.
- Dihansih E, Handarini R, Haerina N. 2017. Kualitas Sensoris Daging Itik Lokal Jantan (*Anas Platyrhinchos*) yang Diberi Larutan Daun Sirih (*Pipper Betle Linn*) dalam Pakan Komersil. *Jurnal Peternakan Nusantara* ISSN 2442-2541 VOL 3 No 1.
- Djawang VUP, Sundari A, Susiati M. 2019. Pengaruh Pemberian Nanokapsul Jus Kunyit dalam Ransum Terhadap Kualitas Karkas dan Organoleptik Daging Itik Lokal Jantan. [Skripsi]. Fakultas Agroindustri. Universitas Mercu Buana.
- Febriana D. 2006. Sifat Organoleptik Daging dan Sosis dari Itik yang mendapat Tepung Daun Beluntas (*Pluchea indica L.*) dalam Pakan. [Skripsi]. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fernando D. 2007. Sifat Fisik dan Organoleptik Daging Ayam Broiler yang diberi Pakan dengan Penambahan Tepung Daun Sambiloto. [Skripsi]. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hafid H, Nuraini, Syam A. 2000. Kualitas Daging Kambing Lokal dengan Metode Pelayuan dan Pemasakan serta Umur yang Berbeda. Laporan Penelitian. Fakultas Pertanian. Universitas Haluoleo. Kendari.
- Hustlany R. 2001. Identifikasi dan Karakterisasi Komponen Off-odor pada Daging Itik [Skripsi]. [Bogor (Indonesia)] IPB.
- Khaerina N, Dihansih E, Handarini R. 2017. Kualitas Sensoris Daging Itik Lokal Jantan (*Anas Platyrhinchos*) yang Diberi Larutan Daun Sirih (*Pipper Betle Linn*) dalam Pakan Komersil. *Jurnal Peternakan Nusantara* ISSN 2442-2541 VOL 3 No 1.
- Matitaputty PR, Suryana. 2010. Karakteristik Daging Itik dan Permasalahan Serta Upaya Pencegahan Off-flavoer Akibat Oksidasi Lipida. *Wartazoa* 3 (20): 130-138.
- Meera A, Prakash SJ, Prakash SO. 2013. *Garcinia Indica for Metabolic Syndrome-a Review. International Jurnal of Experimental Pharmacologi*. Vol 3, Issue 2;57-60.
- Reny DT. 2009. *Keempukan Daging dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Balai Teknologi Pertanian, Lampung.
- Siti NW, Sukmawati IN, Ardika IN, Sumerta NM, Witaradi NN, Kusumawati C, Roni GK. 2016. Pemanfaatan Ekstrak Daun Pepaya Terfermentasi untuk Meningkatkan Kualitas Daging Ayam Kampung. *Majalah Ilmiah Peternakan* Vol 19 (2).
- Soeparno. 2005. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soeparno. 2009. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan kelima. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soeparno. 2011. *Ilmu Nutrisi dan Gizi Daging*. Cetakan pertama. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Suprijatna E. 2010. Strategi Pengembangan Ayam Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berwawasan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Unggas Lokal* ke IV. Hal. 55 – 79.
- Warris. 2000. *Meat Science an Introductory Text*. CABI Publishing, Bristol.
- Winarno FG. 1997. *Keamanan Pangan* [naskah akademis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Winarno FG. 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulfahmi M, Pramono YB, Antonius H. 2013. Pengaruh Marinasi Ekstrak Kulit Nenas (*Ananas Comocous L. Merr*) Pada Daging Itik Tegal Betina Afkir Terhadap Kualitas Keempukan dan Organoleptik. *Jurnal Pangan dan Gizi*. Vol. 4 No. 8.

KUALITAS SENSORIS DAGING ITIK AFKIR YANG DIBERI TEPUNG DAUN ASAM GELUGUR (GARCINIA ANTROVIRIDIS) DALAM RANSUM NONKONVENTSIONAL TERFERMENTASI

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | usnsj.com
Internet | 83 words — 2% |
| 2 | Efrilia Tri Wahyu Utami. "KONSUMSI DAN KOEFISIEN CERNA SERAT KASAR DOMBA LOKAL SUPLEMENTASI TEPUNG DAUN WARU", JURNAL PETERNAKAN NUSANTARA, 2020
<small>Crossref</small> | 71 words — 2% |
| 3 | Yessy Tamu Ina, Iven Patu Sirappa. "PEMANFAATAN CAIR TEMPURUNG KELAPA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ORGANOLEPTIK DAN KIMIAWI DAGING SAPI", Jurnal Peternakan Nusantara, 2021
<small>Crossref</small> | 36 words — 1% |
| 4 | Efi Anggraeni, Agus Djamaruddin, Dewi Ratnasari. "PEMBUATAN DAN UJI ORGANOLEPTIK SERBUK INSTAN MENTIMUN (<i>Cucumis sativus L.</i>) SEBAGAI ANTIHIPERTENSI DAN PENAMBAHAN JERUK NIPIS SEBAGAI RASA KHAS (<i>Citrus aurantifolia</i>)", Journal of Holistic and Health Sciences, 2021
<small>Crossref</small> | 35 words — 1% |
| 5 | ejurnal.undana.ac.id
Internet | 28 words — 1% |

- 6 journal.unpad.ac.id 27 words – 1 %
Internet
- 7 Vanessa Rambet, J. F. Umboh, Y. L.R. Tulung, Y. H.S. Kowel. "KECERNAAN PROTEIN DAN ENERGI RANSUM BROILER YANG MENGGUNAKAN TEPUNG MAGGOT (HERMETIA ILLUCENS) SEBAGAI PENGGANTI TEPUNG IKAN", ZOOTEC, 2015 25 words – 1 %
Crossref
- 8 repository.usu.ac.id 20 words – < 1 %
Internet
- 9 uswim.e-journal.id 20 words – < 1 %
Internet
- 10 Aminullah Aminullah. "CHANGES IN PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF USED PALM OIL (JELANTAH) ON CHICKEN FRYING", JURNAL PERTANIAN, 2018 19 words – < 1 %
Crossref
- 11 Muhammad Masli, Maya Preva Biantary, Heni Emawati. "The Influence of Regulator Grow Essence Auksin IAA And The Onion Extract to Multiplication Cuttings Meranti Sabut (*Shorea parvifolia Dyer.*).", AGRIFOR, 2019 19 words – < 1 %
Crossref
- 12 eprints.undip.ac.id 11 words – < 1 %
Internet

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY

ON

EXCLUDE SOURCES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF